

PROVIDEAN VIRATEC 10 CV 4L



Vacuna canina múltiple
Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados (DICT₅₀%/dosis): Distemper canino ($\geq 10^4$), *Parvovirus canino* ($\geq 10^{6.5}$), Adenovirus canino Tipo 2 ($\geq 10^3$), Parainfluenza canina ($\geq 10^5$) y Coronavirus canino inactivado ($\geq 10^5$) y bacterinas por dosis de: *Leptospira interrogans* serovar *Canicola* ($\geq 10^7$), *Leptospira interrogans* serovar *Pomona* ($\geq 10^7$) y *Leptospira kirschneri* serovar *Grippotyphosa* ($\geq 10^7$)

ESPECIES: Caninos.

DOSIS: Administrar 1 ml por animal, vía subcutánea o intramuscular.

INDICACIONES DE USO: Vacuna para la prevención de Moquillo, Parvovirus, Hepatitis, Coronaviriosis, enfermedad respiratoria producida por Adenovirus tipo 2, Parainfluenza y leptospirosis en caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.

Plan de vacunación sugerido: En cachorros a partir de las 6 semanas de vida, aplicar un programa de vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas entre cada una de ellas. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema de vacunación. Aplicar una dosis de refuerzo todos los años. El plan de vacunación debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo con las condiciones específicas de cada animal, región y/o entorno.

FORMA DE USO Y ADMINSTRACIÓN: Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno. Mediante aguja y jeringa estéril extraer asépticamente el diluyente y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar hasta obtener una suspensión homogénea. Administrar 1ml por vía subcutánea o intramuscular.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar.
- Usar todo el contenido inmediatamente después de reconstituirlo.
- Utilizar agujas y jeringas descartables estériles para su aplicación.
- Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a **PROVIDEAN VIRATEC 10 CV 4L**, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, inactivar la vacuna reduciendo así su eficacia.
- Evitar la utilización de desinfectantes para la limpieza de agujas ya que los mismos pueden inactivar la vacuna.
- Evitar la vacunación de hembras gestantes.
- Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Dicho rendimiento puede verse afectado por condiciones propias del individuo, que deben ser tenidas en cuenta por el Médico Veterinario, en forma previa a la inmunización.

REACCIONES ADVERSAS: Todas las vacunas pueden generar reacciones de hipersensibilidad. En el caso de producirse reacciones de tipo anafilácticas o de hipersensibilidad post vacunación, el Médico Veterinario debe administrar el tratamiento específico.

RETIRO: No aplica.

PRESENTACIÓN:

Caja x 25 dosis (liofilizado + diluyente)

REGISTRO: 4A-10811-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador