

PROVIDEAN VIRATEC 6CV



Vacuna canina múltiple
Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis de 1 ml de vacuna reconstituida contiene: Virus atenuados (DICT50%/dosis): Distemper canino ($\geq 10^4$), Parvovirus canino ($\geq 10^6$), Adenovirus canino Tipo 2 ($\geq 10^3$), Parainfluenza canina ($\geq 10^5$) y Coronavirus canino inactivado ($\geq 10^5$).

ESPECIES: Caninos.

DOSIS DE PROVIDEAN VIRATEC 6CV: Administrar 1 ml por animal, vía subcutánea o intramuscular.

INDICACIONES DE USO: Vacuna para la prevención de Moquillo, Parvovirus, Hepatitis, Coronaviriosis de los caninos y enfermedad respiratoria producida por Adenovirus tipo 2 y Parainfluenza de los caninos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.

PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDO:

Primovacunación: En cachorros a partir de las 6 semanas de vida, aplicar un programa de vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas entre cada una de ellas. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema de vacunación.

Revacunación: Aplicar una dosis de refuerzo todos los años.

*El plan de vacunación, debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones específicas de cada animal, región y/o entorno.

FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN: Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno.

Mediante aguja y jeringa estéril extraer asépticamente el diluyente y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar hasta obtener una suspensión homogénea. Administrar 1 ml por vía subcutánea o intramuscular.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar.
- Usar todo el contenido inmediatamente después de reconstituirlo.
- Utilizar agujas y jeringas descartables estériles para su aplicación.
- Reconstituir la fracción liofilizada exclusivamente con el diluyente suministrado junto a **PROVIDEAN VIRATEC 6 CV**, ya que otros diluyentes podrían, eventualmente, inactivar la vacuna reduciendo así su eficacia.
- Evitar la utilización de desinfectantes para la limpieza de agujas ya que los mismos pueden inactivar la vacuna.
- Evitar la vacunación de hembras gestantes.
- Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Dicho rendimiento puede verse afectado por condiciones propias del individuo, que deben ser tenidas en cuenta por el Médico Veterinario, en forma previa a la inmunización.

REACCIONES ADVERSAS: Todas las vacunas pueden generar reacciones de hipersensibilidad. En el caso de producirse reacciones de tipo anafilácticas o de hipersensibilidad post vacunación, el Médico Veterinario debe administrar el tratamiento específico.

RETIRO: No aplica.

PRESENTACIÓN:

Caja x 25 dosis (liofilizado + diluyente)

REGISTRO: RIP-BIO-42

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador