

PROVIDEAN VIRATEC DP



Vacuna contra parvovirus y distemper canino
Liofilizado+diluyente



FÓRMULA: Cada dosis de 0,5 ml de vacuna reconstituida contiene virus atenuados (DICT₅₀ %):
Distemper canino ($\geq 10^5$), Parvovirus canino ($\geq 10^7$)

ESPECIES: Caninos.

DOSIS: Administrar 0.5 ml por animal, vía subcutánea o intramuscular.

INDICACIONES DE USO: Vacuna viva atenuada contra la parvovirus y el distemper (moquillo) canino para uso en cachorros sanos y mayores a 4 semanas de edad.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea o intramuscular.

PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDO: PROVIDEAN VIRATEC DP es una vacuna con elevada titulación viral, indicada para el comienzo de la vacunación en cachorros jóvenes, a partir de las 4 a 6 semanas de vida.

Primovacuna: Se recomienda aplicar un programa de vacunación con un mínimo de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 a 4 semanas entre cada una de ellas. Si la última dosis del programa fue aplicada antes de las 16 semanas de vida, se recomienda administrar una dosis adicional debido a que los anticuerpos maternos pueden interferir en un adecuado desarrollo de la respuesta inmune del cachorro.

Revacunación: Se recomienda la revacunación anual.

*El plan de vacunación, debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones y necesidades específicas de cada animal.

FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN: Se recomienda la vacunación de animales en buen estado de salud y nutricional, libres de parásitos y normotérmicos. Evitar en lo posible situaciones de estrés producidas por condiciones adversas del entorno. Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el contenido del diluyente provisto con la vacuna y reconstituir la fracción liofilizada. Agitar suavemente hasta obtener una suspensión homogénea. Administrar 0,5 ml por vía subcutánea o intramuscular.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar.
- Usar todo el contenido inmediatamente después de reconstituirlo.
- Utilizar jeringas descartables estériles para su aplicación.
- Evitar la vacunación de hembras gestantes.
- Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Esto puede verse afectado por condiciones propias del individuo. Se recomienda evitar el contacto con fuentes contaminadas hasta que se haya completado el esquema básico de vacunaciones.

REACCIONES ADVERSAS: Todas las vacunas pueden generar reacciones de hipersensibilidad. En tal caso el Médico Veterinario deberá administrar el tratamiento específico.

RETIRO: No aplica.

PRESENTACIONES:

Caja x 25 dosis (liofilizado+diluyente)

REGISTRO: RIP-BIO-45

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador