

## PROVIDEAN VIRATEC PC



### Vacuna contra parvovirus y coronavirus canino

Líquida



**FÓRMULA:** Cada dosis de 1 ml de vacuna contiene:  
Parvovirus canino vivo atenuado (DICT<sub>50</sub> %/dosis)  $\geq 10^{6.5}$   
Coronavirus canino inactivado (DICT<sub>50</sub> %/dosis)  $\geq 10^5$  por dosis.

**ESPECIES:** Caninos.

**DOSIS:** Administrar 1 ml por animal, vía subcutánea o intramuscular.

**INDICACIONES DE USO:** Vacuna para la prevención de la parvovirus y coronavirosis de los caninos.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Subcutánea o intramuscular.

#### PLAN DE VACUNACIÓN SUGERIDO:

**Primovacunación:** En cachorros a partir de las 6 semanas de vida, aplicar un programa de vacunación de tres dosis, manteniendo un intervalo de 3 semanas entre cada una de ellas. Evitar el contacto del animal con fuentes potenciales de contagio hasta que se haya completado su esquema de vacunación.

**Revacunación:** Aplicar una dosis de refuerzo todos los años.

\* El plan de vacunación, debe ser adaptado a criterio del Médico Veterinario de acuerdo a las condiciones específicas de cada animal, región y/o entorno.

**FORMA DE USO Y ADMINISTRACIÓN:** Se recomienda la vacunación de perros en buen estado de salud general, con correcto desarrollo nutricional, desparasitados, sin estado febril y fuera de cuadros de estrés por condiciones adversas del entorno.

Mediante jeringa y aguja estéril extraer asépticamente el contenido y administrar 1 ml siendo de elección la vía subcutánea o intramuscular.

#### PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Conservar el producto en su envase original entre 2° y 8° C. No congelar. Usar todo el contenido.
- Utilizar agujas y jeringas descartables estériles para su aplicación.
- Evitar la utilización de desinfectantes para la limpieza de agujas ya que los mismos pueden inactivar la vacuna.
- Evitar la vacunación de hembras gestantes.
- Mediante pruebas controladas de laboratorio, se ha demostrado que este producto cumple con las normas de seguridad y eficacia para inmunizar animales sanos. Dicho rendimiento puede verse afectado por condiciones propias del individuo, que deben ser tenidas en cuenta por el Médico Veterinario, en forma previa a la inmunización.

**REACCIONES ADVERSAS:** En el caso de producirse reacciones de tipo anafilácticas o de hipersensibilidad post vacunación, el Médico Veterinario debe administrar el tratamiento específico.

**RETIRO:** No aplica.

#### PRESENTACIÓN:

Caja x 50 frascos de 1 dosis líquida

**REGISTRO:** 4A-10863-AGROCALIDAD

**ELABORADO POR:** FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246