

## PULGA OUT FARBIOVET



**Antiparasitario externo**  
Solución tópica



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 ml contiene:

Fipronil.....	10 g
Ivermectina.....	1 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

**INDICACIONES:** Se utiliza en el control y tratamiento de infecciones de pulgas, piojos y garrapatas, su novedoso mecanismo permite que entre en contacto con la grasa de la piel y folículos de los animales, formando una película que se distribuye perfectamente por la piel. Previene posteriores infestaciones en perros, debido a su efecto adulticida y larvicida sobre las pulgas. Elimina el 100% de pulgas, garrapatas y piojos en sus formas adultas, larvas y ninfas.

**PULGA OUT FARBIOVET** puede ser usado en cachorros a partir de 10 semanas de edad. La mascota puede ser bañada después de dos días de aplicación. Es necesario aplicar **PULGA OUT FARBIOVET** en animales que **NO** han sido bañados. Evitar que la mascota lama el producto.

**DOSIS:**

**Ivermectina:** 500 ug/kg de peso corporal vía tópica.

**Fipronil:** La dosis recomendada para las diferentes especies es de: 6,7 mg/kg en caninos 1 mg/kg en aves, cuyes y conejos.

Para perros de 2 a 10 kg	0,7 ml de <b>PULGA OUT FARBIOVET</b>
Para perros de 11 a 20 kg	1,5 ml de <b>PULGA OUT FARBIOVET</b>
Para perros de 21 a 40 kg	3 ml de <b>PULGA OUT FARBIOVET</b>
Aves, cuyes y conejos	1 a 2 gotas por kg de peso vivo (0,05 ml)

Generalmente se recomienda una sola dosis. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación, o según la recomendación del Médico veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Tópica. Aplicar la solución directamente sobre la piel, separando el pelo, preferiblemente en 2 puntos, en la base del cuello y entre las escápulas, para evitar el lamido. Es necesario aplicar en animales que **NO** han sido bañados.

**PRECAUCIONES:** Usar guantes al aplicar el producto. No fumar. No comer durante la aplicación. Evitar el contacto con la piel y ojos. En caso de aplicación accidental, lavar con abundante agua. En caso de intoxicación accidental presentar la etiqueta al médico.

**ADVERTENCIAS:** Producto tóxico utilice con precaución.

**REACCIONES ADVERSAS:** En muy raras ocasiones se puede observar después de la aplicación del medicamento veterinario reacciones cutáneas transitorias en la zona de aplicación (decoloración, pérdida de pelo local, picor, rojez) así como picor general o pérdida de pelo. También puede observarse después de su utilización salivación excesiva, signos nerviosos reversibles (sensibilidad incrementada a la estimulación, hiperactividad, temblor muscular, depresión, otros signos nerviosos) o vómito. En caso de lamido de la zona de aplicación, puede observarse hipersalivación transitoria y emesis.

**USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:** Los estudios de laboratorios efectuados usando fipronil no han demostrado efectos teratogénicos o embriotóxicos. No se han

realizado estudios con este medicamento veterinario en animales gestantes ni en lactación.

Con la ivermectina no presenta ninguna contraindicación durante estos periodos de gestación, lactancia o puesta.

Utilícese únicamente de acuerdo con la evaluación beneficio/ riesgo efectuada por el veterinario responsable.

**INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:** Ninguna conocida.

**TIEMPO DE RETIRO:** Carne 12 días, Huevos 48 días.

**ALMACENAMIENTO:** Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

**DECLARACIÓN DE VENTA:** Venta Bajo Receta Médica.

**PRESENTACIONES:**

Jeringas de Plástico conteniendo 3 ml, gotero plástico de polietileno de alta densidad conteniendo 10 ml y 60 ml

**REGISTRO:** 3B2-12425-AGROCALIDAD

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** FARBIOPHARMA S.A.

**Dirección:** Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador