

PULGA OUT SPRAY



Antiparasitario externo
Solución tópica



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Fipronil.....	0,25 g
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Está indicado en el control y tratamiento de infestación por ectoparásitos: pulgas, garrapatas, ácaros y piojos. Su acción es prolongada por el efecto residual del Fipronil también se puede aplicar en el entorno para el control de cucarachas, insectos y hormigas.

DOSIS: Aplicar sobre la piel directamente, separando el pelo. De 3 a 6 ml por kg de peso según la cantidad de ectoparásitos presentes (1 ml equivale a 3 pulsaciones).

Generalmente se recomienda una sola dosis. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación en caninos frente a infestaciones de *Ctenocephalides felis* cada 2 a 3 meses y por *Rhipicephalus sanguineus*, *Ixodes scapularis* y *ricinus* y *Demacentor reticulatus* cada mes, en felinos cada 5 semanas, o según la recomendación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Aplicar la solución directamente sobre la piel, separando el pelo.

CONTRAINDICACIONES: No tratar a gatos menores de 3 meses de edad, en general no aplicar sobre animales menores de esta edad ni en hembras gestantes, como tampoco en hembras en lactación.

ADVERTENCIAS: Use guantes, especialmente cuando aplique a un grupo de animales. Aplique sobre los animales en lugares bien ventilados. Lavarse bien las manos después del tratamiento. Evitar el contacto con la piel y ojos durante la aplicación. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. Aplicar el producto a animales que NO han sido bañados, se puede bañar al animal 2 días después de la aplicación del producto. Aplicar a cachorros a partir de 10 semanas de edad.

REACCIONES ADVERSAS: La sobredosis de Fipronil puede causar reacciones locales como inflamación cutánea, eritema, intenso prurito y caída del pelo y sistémico como gastroenteritis, vómitos, etc.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No usar en hembras gestantes, ni en hembras en periodo de lactación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Se puede combinar con Metropeno para aumentar su espectro, teniendo como ventaja que el Metropeno es un inhibidor del desarrollo de los insectos prácticamente inocuos para mascotas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Spray x 60 ml.

Spray x 100 ml.

REGISTRO: 3B1-13512-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador