

PULGA OUT TALCO



Antiparasitario externo
Polvo tópico



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Fipronil.....	0,6 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado para controlar y tratar la infestación de ectoparásitos como garrapatas, piojos masticadores y pulgas en animales domésticos.

DOSIS: Espolvorear sobre el animal de manera suficiente y frotar con la mano hasta que entre en contacto con la piel. De igual manera aplicar de forma generosa en la cama del animal o el lugar donde reposa. Generalmente se recomienda una sola dosis. Repetir los tratamientos de acuerdo al grado de infestación o según la recomendación del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica.

CONTRAINDICACIONES: No se debe utilizar en animales con hipersensibilidad o alergia sabida a este principio activo. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

ADVERTENCIAS: Uso externo únicamente. En caso de intoxicación consulte al Médico y entregue esta etiqueta. Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente. Evitar derrames. Desechar en lugares apropiados. Evitar contaminar cursos de agua como: Ríos, arroyos, etc. En caso de salpicaduras accidentales, inmediatamente lavar las partes afectadas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No tratar con Fipronil hembras gestantes, como tampoco hembras en lactación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Se puede combinar con Metropeno para aumentar su espectro, teniendo como ventaja que el Metropeno es un inhibidor del desarrollo de los insectos prácticamente inocuo para perros, gatos, mamíferos y vertebrados. A diferencia del Fipronil, no hay reporte de resistencia de las pulgas al Metropeno.

REACCIONES ADVERSAS: El Fipronil en concentraciones excesivas (21%) puede por la exposición causar efectos nocivos que pueden causar reacción local como inflamación cutánea, eritema, intenso prurito y caída del pelo y sistémico como gastroenteritis, vómitos, etc. No tratar a gatos menores de 3 meses de edad, en general no aplicar sobre animales menores de esta edad.

TIEMPO DE RETIRO: Carne 12 días. Huevos 48 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura no mayor de 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Libre.

PRESENTACIONES:

Sobre x 8 g
Frasco x 60 g
Frasco x 100 g

REGISTRO: 3B1-2-10900-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador