

PULMOTIL™ AC



Antimicrobiano
Oral



COMPOSICIÓN: Tilmicosina (como fosfato de tilmicosina): 250 mg por ml.

INDICACIONES

Pollos: Para el tratamiento y control de infecciones respiratorias en parvadas de pollos, asociadas con *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, y *Pasteurella multocida*.

CONTRAINDICACIONES: No emplear en aves ponderas de huevo para consumo humano.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: Sólo para uso oral. Contiene edetato Disódico: no inyectar.

La Seguridad de tilmicosina no ha sido establecida en animales usados con propósitos de reproducción. No permitir el acceso de caballos u otros equinos al agua de bebida conteniendo tilmicosina. El contacto con la piel puede causar irritación o sensibilización. Usar ropa protectora y guantes impermeables para el mezclado y manejo del producto.

Lavarse las manos después de manipular el producto. Si ocurre contacto accidental con los ojos, lavar inmediatamente con el agua. Una vez abierto, el frasco de **PULMOTIL™ AC** deberá consumirse antes de los 3 meses.

PERÍODO DE RETIRO: El agua de bebida conteniendo tilmicosina debe ser retirada del consumo de las aves 7 días antes de su sacrificio.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

VÍA ADMINISTRACIÓN: Oral.

IMPORTANTE: Debe ser diluido antes de su administración en aves.

DOSIS:

Pollos: Para ser incluido en el agua de bebida.

Proveer una dosis diaria de 15-20 mg de tilmicosina por kilogramo de peso corporal (0.3 ml **PULMOTIL™ AC** por litro) por tres días consecutivos.

En pruebas clínicas esto equivale a una dosis diaria de aproximadamente 20 mg/kg.

Una botella de 240 ml de **PULMOTIL™ AC** es suficiente para medicar 800 litros de agua de bebida.

El agua de bebida medicada debe ser fresca, preparada cada 24 horas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar dentro de un rango de temperatura de 0 a 30°C.

Evite la exposición directa de los rayos solares.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 240 ml

REGISTRO: 2C2-6147-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO