RADEK F

Fasciolicida y antiparasitario interno
Oral

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Fenbendazol ..... 100 mg
Triclabendazol ..... 100 mg
Excipientes c.s.

INDICACIONES: Tratamiento específico contra la *Fasciola hepatica* en bovinos, ovinos y caprinos. Además es efectivo contra: *Ostertagia ostertagia*., (L3 y L4 incluyendo inhibidas), *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Strongyloides* spp., *Capillaria* spp., *Bunostomum* spp., *Dictyocaulus* spp., *Chavertia* spp., *Oesophagostomum* spp., *Moniezia* spp.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: radek F se administra en una sola dosis de 6 ml x cada 50 kg de peso en bovinos, ovinos y caprinos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES:
Tiempo de retiro: No administrar a vacas en lactancia, cuando se destine la leche a la alimentación humana. Carne 28 días.

PRESENTACIÓN:
Envase x 1 litro.

REGISTRO: 3A3-10205-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.