

RATEX FARBIOVET



Raticida
Cebo



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Bromadiolona 0,16 g
Excipientes c.s.p..... 100 g

INDICACIONES: Es un potente raticida, que al ser ingerido causa la muerte por hemorragia interna causada por la bromadiolona, evitando así la descomposición y mal olor de los roedores muertos.

DOSIS: Colocar pequeñas cantidades de **RATEX**, aproximadamente 10 g por comedero, en cajitas vacías, tubos plásticos, etc. Se debe ubicar el cebo en las madrigueras o cerca de los sitios donde hayan estado alimentándose o causando molestias.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

ADVERTENCIAS: Una vez abierto debe usar íntegramente el producto. No almacenar con alimento y medicinas. Evitar la ingestión y el contacto con la piel. No verter en fauna acuática, cosechas, etc.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Libre.

PRESENTACIONES:

Sobre x 30 g (caja x 40).
Balde x 2.5 kg.

REGISTRO: 18A-12044-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador