

## RATKILLER



**Rodenticida**  
Cebo rodenticida



**COMPOSICIÓN:** Cada 100 g contiene:

Bromadiolona .....	0.005 g
Excipiente (pellet/cereal) c.s.p.....	100 g

**ACCIÓN TERAPÉUTICA:** Rodenticida.

**FORMA FARMACÉUTICA:** Cebo rodenticida, pellets, cereales.

**INDICACIONES DE USO: RATKILLER** es un rodenticida anticoagulante sumamente tóxico. Es resistente a la humedad y a condiciones extremas de la intemperie.

Las ratas envenenadas mueren de hipoxia tisular resultante de una hemorragia interna masiva que se inicia en 2 a 5 días después de su ingestión. El rodenticida interfiere sobre la función normal de la vitamina k. La hemorragia se debe a un aumento de la permeabilidad capilar y un descenso de la coagulación sanguínea, ya que la síntesis de los factores de coagulación (protrombina) queda inhibida en el hígado por una actividad inadecuada de vitamina k.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Es conveniente identificar las rutas que frecuentan las ratas (*Rattus rattus*, *Rattus norvegicus*) y ratones (*Mus musculus*).

Utilizar una caja de madera, plástico y/o cartón con orificios alrededor de la misma, con la finalidad de mantener el **RATKILLER** alejado de las personas y de los animales domésticos. De esta manera protegemos el cebo y facilitamos que coman los roedores. Utilizar guantes para el manipuleo del producto para evitar impregnar el olor humano a través de las manos.

Colocar 1 funda de **RATKILLER** en la trampa y reponer cuantas veces sea necesario, hasta obtener un máximo control de los roedores.

La distancia entre los comederos para ratas debe ser de 10 metros y para ratones, de 5 metros.

No mezcle con otros alimentos, ya que el olor es atrayente para el gusto de los ratones.

Lávese las manos con abundante agua y jabón después de la utilización del producto.

**USO VETERINARIO:**

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

**ADVERTENCIAS:**

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase
- Evite la contaminación de alimentos y agua.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y la boca.
- Mantener alejado el producto de personas y animales domésticos.
- No colocar el producto en recipientes que son utilizados para el consumo humano y animal.
- Venta libre.

**MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**REACCIONES ADVERSAS Y ANTÍDOTOS:**

En caso de intoxicación de personas (avisar al médico).

En animales domésticos, aplicar vitamina K vía intramuscular u

oral.

**PRESENTACIONES:**

Sobre x 25 g

Sobre x 50 g

Dispenser de 40 sobres x 25 g.

Dispenser de 20 sobres x 50 g.

Balde de 60 sobres x 25 g

**Q.F.R.:** Nelly López de Cobo

**REGISTRO:** 3B4-11808-AGROCALIDAD

**REGISTRO PANAMÁ:** RQ-679-16

**FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:** C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

**Servicio al cliente:** (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436