

RENDIK SELENIO



Suplemento de Vitamina E y Selenio
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Selenito de Sodio 0,15 g
Vitamina E (dl- α -Tocoferol acetato) 20 g
Excipientes c.s.p. 100 ml

DOSIFICACIÓN DE RENDIK SELENIO:

ESPECIE	DOSIS REFERENCIAL	DOSIS
OVINOS	Selenio de sodio 0,05 mg/kg Vitamina E 7 mg/kg	2 ml/60 kg/SC
BOVINOS PORCINOS	Selenio de sodio 0,05 mg/kg Vitamina E 6 mg/kg	3 ml/100 kg/SC

Generalmente se aplica 1 dosis que se puede repetir con intervalos semanales, esto según el criterio del Médico Veterinario.

ESPECIES: Ovinos, Bovinos, Porcinos.

INDICACIONES: RENDIK SELENIO se administra por vía parenteral para corregir alteraciones producidas por deficiencias en Vitamina E y Selenio, principalmente etiologías reproductivas relacionadas con el estrés oxidativo, retención placentaria, metritis postparto y mastitis. Para bovinos en situaciones de estrés causadas por: transporte, cambios bruscos de alimentación, ingreso de animales nuevos, infecciones, traumas tisulares, dietas elevadas en ácidos grasos. En porcinos para reducir la mortalidad por estrés calórico y mejorar la fertilidad del verraco, además de tener un efecto importante sobre el sistema inmunológico. En ovinos se indica principalmente para distrofia muscular.

ADVERTENCIAS: En caso de que el animal esté recibiendo selenio en sales minerales, no aplicar RENDIK SELENIO por vía parenteral sin el cálculo adecuado del requerimiento de selenio para evitar sobredosificación.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar en un lugar fresco y seco protegido de la luz, a una temperatura entre 15°C y 30°C.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

RETIRO: No requiere.

TIPO DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

CONTRAINDICACIONES: Los productos con vitamina E y selenio sólo deben ser usados en las especies para los cuales están aprobados. Debido a que el selenio puede ser muy tóxico, los productos que lo contienen deben ser utilizados con prudencia. Cuando se administra por vía IV en los equinos, hacerlo lentamente.

En caso de que el animal esté recibiendo selenio en sales minerales, no aplicar RENDIK SELENIO por vía parenteral sin el cálculo adecuado del requerimiento de selenio (riesgo de sobredosificación). No usar en caso de hipersensibilidad a alguna de las sustancias activas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA: No se ha documentado información acerca de la seguridad del uso de la suplementación de Vitamina E/Selenio durante la lactancia/reproducción.

Interacciones con otros medicamentos: Las siguientes interacciones medicamentosas han sido documentadas o son teóricamente posibles en las personas o en los animales que están recibiendo vitamina E/selenio, y pueden ser importantes en los pacientes veterinarios.

Hierro: Grandes dosis de Vitamina E pueden demorar la respuesta hematológica al tratamiento con hierro en los pacientes con anemia ferropriva.

Vaselina: Puede reducir la absorción de la Vitamina E administrada por vía oral.

Vitamina E: La absorción, la utilización y el almacenamiento pueden ser favorecidos por la Vitamina E.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml

Frasco x 50 ml

Frasco x 100 ml

REGISTRO: 1A-1B-18342-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador