

ROFLOXYN 20



Antibiótico
Solución oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Enrofloxacin.....20 g
Excipiente c.s.p.100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antibiótico.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución oral.

INDICACIONES DE USO: Antibiótico de amplio espectro que pertenece al grupo de las Quinolonas de tercera generación y alto grado de biodisponibilidad. Su mecanismo de acción bactericida se fundamenta bloqueando la acción de la enzima girasa a nivel del ácido desoxirribonucleico (ADN) cuando transmite su código genético. Se absorbe rápidamente y es de acción terapéutica inmediata contra microorganismos Gram positivos, Gram negativos y Mycoplasmas. Actúa efectivamente en el caso de resistencia cruzada a otros antibióticos.

En aves para el control y tratamiento de enfermedades infecciosas como: Enfermedad Respiratoria Crónica, Sinovitis infecciosa, Paratifoidea, Coriza infecciosa, Cólera aviar, Salpingitis, Colisepticemia y demás alteraciones causadas por: *E. Coli*, *Haemophilus*, *Pasteurella*, *Salmonella*, *Mycoplasma*, *Staphylococcus* y *Streptococcus* en pollitas, pollos de engorde, reproductoras y pavos.

DOSIS SUGERIDA: Como dosis general 10 mg PA/kg de peso vivo. En el agua de bebida 1 ml (20 gotas) ROFLOXYN 20/4 litros de agua.

PRINCIPIO ACTIVO mg	ROFLOXYN 20 ml	AGUA DE BEBIDA litros
2 500	12.5	50
5 000	25	100
10 000	50	200
20 000	100	400
50 000	250	1 000
100 000	500	2 000

0.5 ml ROFLOXYN 20/10 kg de peso vivo.

Preparar la medicación diariamente y administrar durante 5 días seguidos. El primer día del tratamiento se recomienda duplicar la dosis calculada.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. En el agua de bebida. Usar soluciones frescas. El agua medicada debe ser la única fuente de bebida durante el tratamiento, calculando la cantidad necesaria de agua que consuman las aves en 12 horas.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- Neutralizar el agua de bebida antes de medicar. No administrar a aves que están en época de postura. No debe aplicarse conjuntamente con otros productos antibacterianos.
- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- No reutilizar este envase.

- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO: 7 días antes del sacrificio.

PRESENTACIONES:

Frasco x 1 litro.

Gotero x 10 ml

Gotero x 100 ml

Q.F.R.: Nelly López de Cobo.

REGISTRO: 2C1-9815-AGROCALIDAD.

REGISTRO PANAMÁ: RF-8100-17

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436