RUMIGAN 25%

Antihelmítico de amplio espectro
Suspensión oral

FÓRMULA: Cada 100 ml contiene:
Albendazol..... 25.0 g
Excipientes c.s.p. ..... 100.0 ml

ESPECIES: Bovinos y ovinos.

DOSIS DE RUMIGAN 25%:

DOSIS PRODUCTO (ml)				
ESPECIES	**OVINOS Y CAPRINOS**		**BOVINOS**	
PESO (kg)	**NEMATODOS (5 mg/kg)**	**FASCIOLA HEPÁTICA (7.5 mg/kg)**	**NEMÁTODOS (7.5 mg/kg)**	**FASCIOLA HEPÁTICA (10 mg/kg)**
50	1 ml	1.5 ml	1.5 ml	2 ml
100	2 ml	3 ml	3 ml	4 ml
200	4 ml	6 ml	6 ml	8 ml
400	8 ml	12 ml	12 ml	16 ml
500	10 ml	15 ml	15 ml	20 ml
700	14 ml	20 ml	20 ml	28 ml
1 000	20 ml	30 ml	30 ml	40 ml
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral. Administrar dosis única, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.				

INDICACIONES DE USO: RUMIGAN 25% está indicado para la eliminación y el control de un amplio espectro de parásitos internos que incluyen tenias (cabezas y segmentos), nematodos abomasales e intestinales (adultos y larvas de cuarta etapa) y gusanos pulmonares (adultos y estados larvarios). Además actúa contra Fasciola hepática.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

FARMACOCINÉTICA: Tiene mejor absorción oral que otros benzimidazoles. Durante un período de 9 días se recuperó alrededor del 47% de una dosis oral (como metabolitos) en la orina.
Después de la administración en ovejas, el compuesto madre experimentó un efecto de primer paso muy rápido, por lo cual se detectó en forma transitoria o fue identificable en el plasma. Los metabolitos activos sulfóxido y sulfona de albendazol alcanzaron concentraciones plasmáticas máximas 20 horas después de una dosis.

MECANISMO DE ACCIÓN: Los agentes antiparasitarios benzimidazólicos tienen un amplio espectro de actividad contra una variedad de parásitos internos patógenos. En lo parásitos susceptibles, se cree que su mecanismo de acción es romper los sistemas de transporte microtubulares intracelulares al unirse selectivamente y dañar a la tubulina impidiendo la polimerización de esta e inhibiendo la formación de microtúbulos. Los benzimidazoles también actúan en concentraciones más altas interrumpiendo las vías metabólicas, incluidas la malato deshidrogenasa y la fumarato reductasa.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:
- No administrar en el primer tercio de la gestación.
- Evitar dosis altas.
- Precaución durante la preñez.
- No administrar en los primeros 45 días de gestación.

INTERACCIONES: No se ha reportado en animales.

REACCIONES ADVERSAS:
- Albendazol tiene afinidad por las células que se dividen rápidamente y puede causar toxicidad en la médula ósea y el epitelio intestinal.
- En otras especies, a dosis aprobadas, existe un amplio margen de seguridad.
- Efectos adversos puede incluir anorexia, letargo.

RETIRO:
Bovinos: 14 días.
Ovinos y Caprinos: 10 días. No usar en ganado lechero en producción.

PRESENTACIONES:
Jeringa x 20 ml
Frasco x 100 ml
Garrafa x 400 ml
Garrafa x 1 000 ml
Garrafa x 2 000 ml
Galón x 3.8 litros

REGISTRO: 3A1-1-2-3-9944-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: FARBIOPHARMA S.A. para INPEL QUALITY
Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Píntag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador