

SARNIL



Antiparasitario externo Suspensión



Benzil benzoato 30.00 Pinus palutris 0.50 m Benzalconio cloruro 0.01 m Trietanolamina 2.50 m Excipiente c.s.p. 100 m	COMPOSICION: Cada 100 ml contiene:	
Benzalconio cloruro	Benzil benzoato	30.00 g
Trietanolamina2.50 m	Pinus palutris	0.50 ml
	Benzalconio cloruro	0.01 ml
Excipiente c.s.p	Trietanolamina	2.50 mg
	Excipiente c.s.p.	100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: Antiparasitario externo.

FORMA FARMACÉUTICA: Suspensión.

INDICACIONES DE USO: Controla sarnas y dermatomicosis (tiña) causadas por agentes como *Sarcoptes scabiei, Psoroptes* sp., *Microsporum canis, M. gypseum, Trychophyton mentagrophytes, T. equinum, T. tonsurans*, entre otras especies de hongos que infectan la piel de los animales.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica. Depilar la parte afectada, luego lavar con agua y jabón, secar y aplicar **SARNIL**, realizar el tratamiento tres veces al día.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- · Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- · Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- · No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.
- · No reutilizar este envase.
- · Venta bajo receta médica

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIÓN: Frasco x 100 ml.

Q.F.R.: Nelly López de Cobo.

REGISTRO: 9B1-7087-AGROCALIDAD.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital

Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436