

SINTOSEPT TOXOIDE



Bacterina triple toxoide
Injectable



COMPOSICIÓN: Cada dosis bovina 5 ml contiene cultivos bacterianos inactivados de:

<i>Clostridium septicum</i>	1x10 ⁹
<i>Clostridium chauvoei</i>	4x10 ⁸
<i>Pasteurella multocida</i>	5x10 ⁷
Hidróxido de aluminio.....	15 mg
Formaldehído.....	No más de 0,2%

INDICACIONES: Para la prevención de carbón sintomático, edema maligno y pasteurelosis en bovinos, ovinos y caprinos, a partir de los tres meses de edad.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Aplicar a partir de los 3 meses de edad así: bovinos 5 ml, ovinos y caprinos 2 ml. Los animales primovacunados deben recibir una dosis de refuerzo a las 3-4 semanas después de la primera dosis. Revacunar anualmente o según criterio de Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea exclusivamente.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. Conservar en refrigeración entre 3 y 7° C. No congelar: Agitar el frasco antes de usar:

PRESENTACIONES:

- Frascos x 10 dosis bovinas.
- Frascos x 20 dosis bovinas.
- Frascos x 50 dosis bovinas.
- Frascos x 100 dosis bovinas.

REGISTRO: 4C-8135-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.