

SULFANTIPESTINA



Antibacteriano de amplio espectro
Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:
Sulfadimidina sódica..... 333 mg
(equivalente a 308,87 mg de sulfadimidina base)
Vehículo acuoso c.s.

INDICACIONES: Se recomienda especialmente en infecciones respiratorias, intestinales y podales.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: sulfantipestina se administra en dosis generales de 200 mg x kg de peso (30 ml x cada 50 kg de peso) como dosis inicial (primer día) y 100 mg x kg de peso (15 ml x cada 50 kg de peso) como dosis de mantenimiento durante 4 días más.

Aves: en agua de bebida usar 3 ml x litro de agua. Inyectable usar 0,6 ml x kg de peso. Administrar hasta por 5 días consecutivos.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea o intravenosa lenta.

Tiempo de retiro: Leche 4 días, carne 10 días.

PRESENTACIONES:

Frascos x 50 ml.
Frascos x 100 ml.
Frascos x 500 ml.

REGISTRO: 2B1-1748-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.