

## SULTRI-PET SUSPENSIÓN



Quimioterápico bactericida de amplio espectro

Uso oral



**COMPOSICIÓN:** Cada 5 ml contiene:

Trimetoprim ..... 40 mg  
Sulfametoxasol ..... 200 mg  
Jarabe aromatizado c.s.

**INDICACIONES:** Sultri-pet Suspensión está indicado para el tratamiento de enfermedades causadas por microorganismos sensibles a su principio activo en perros y gatos. Se recomienda especialmente en infecciones entéricas, respiratorias, urinarias y cutáneas causadas por los siguientes microorganismos:

**Bacterias:** *Streptococcus* spp., *Staphylococcus* spp., *Streptococcus zooepidemicus*, *Nocardia* spp., *Chlamydia* spp., *Pasteurella* spp., *Haemophilus* spp., *Listeria monocytogenes*, *Bordetella bronchiseptica* (agente etiológico de la tos de las perreras o kennel cough).

**Enterobacterias:** *Proteus* spp., *Escherichia coli*, *Salmonella* spp., *Klebsiella* spp.

**Hongos:** *Pneumocystis* spp.

**Protozoos:** *Toxoplasma* spp., *Cryptosporidium* spp., *Neospora* spp., *Hepatozoon americanum*.

**Coccidias:** *Cystoisospora (Isospora)* spp., *Eimeria* spp.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO:** La dosis general para caninos y felinos es de 15 mg/kg de peso, equivalentes a 1 ml por cada 3 kg de peso del animal cada 12 horas, según el concepto del Médico Veterinario.

**DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:**

**Infecciones sistémicas y bacteremia:** 3 a 5 días.

**Infecciones de tejidos blandos, tracto urinario y piodermia:** 14 días.

**Coccidiosis:** 10 días.

**Toxoplasmosis:** 28 días.

**Neosporosis:** 4 semanas.

**Otras:** Según criterio del Médico Veterinario.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral.

**PRECAUCIONES:** CONSERVAR A UNA TEMPERATURA NO MAYOR A 30° C. Uso veterinario. Agitar la suspensión antes de cada administración. Venta bajo receta del Médico Veterinario.

**CONTRAINDICACIONES:** No administrar en perros de raza Doberman pinscher, en pacientes con daño del parénquima hepático, disfunción renal grave, trastornos hematológicos o antecedentes de sensibilidad a las sulfonamidas. Se desaconseja su uso en perros con urolitiasis, predispuestos a formar urolitos o con orina muy concentrada.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 100 ml con jeringa dosificadora.

**REGISTRO:** 2C1-14482-AGROCALIDAD.

**ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR:** LABORATORIOS LIFE ECUADOR