

SULTRI-VET



Bactericida de amplio espectro
Injectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Sulfadoxina..... 200 mg
Trimetoprim 40 mg
Vehículo acuoso c.s.

PROPIEDADES: La combinación de sulfadoxina con trimetoprim, actúa sobre la célula bacteriana en dos pasos diferentes de su metabolismo. Esta acción sinérgica se manifiesta por un efecto bactericida superior a la suma de los efectos individuales de las 2 sustancias. Gracias a esto, las dosis de **sultrivet** son mucho menores que las que se recomiendan para las sulfonamidas corrientes. De la misma manera su efecto dura hasta por 48 horas, permitiendo una menor frecuencia en su aplicación.

INDICACIONES: Quimioterápico bactericida indicado en el tratamiento de infecciones producidas por gérmenes grampositivos y gramnegativos, en especial en infecciones urinarias, respiratorias, gastrointestinales y de órganos genitales.

sultrivet se recomienda especialmente en neumonía, septicemia, rinitis, bronconeumonía, pleuroneumonía, enteritis, infecciones del ombligo, colibacilosis, difteria, artritis, meningitis, panadizo, abscesos, heridas infectadas, bordetelosis, metritis, infecciones vaginales, pielonefritis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO DE SULTRIVET: La dosis general es de 3-4 ml por cada 50 kg.

ESPECIE	DOSIS
BOVINOS Y EQUINOS ADULTOS	20 - 30 ml
NOVILLOS Y POTROS	5 - 15 ml
TERNEROS Y OVEJAS	3 - 35 ml
CERDOS	8 - 12 ml
LECHONES	0,5 - 1 ml

Aunque aparentemente, pueden obtenerse resultados satisfactorios luego de una sola dosis, es conveniente repetir la administración luego de 24 - 48 horas de acuerdo con el estado del paciente.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Preferentemente intramuscular. También puede utilizarse la vía subcutánea o la intravenosa lenta; esta última con las siguientes recomendaciones:

- Administrar la totalidad de la dosis del producto en forma lenta (en no menos de un minuto).
- No administrar en animales estresados, cansados o nerviosos.

PRECAUCIONES: No se recomienda el uso en animales con deficiencias renales. Es conveniente proveer al animal de abundante agua.

Tiempo de retiro:

Leche: 3 días.

Carne: 10 días.

PRESENTACIONES:

Frascos x 20 ml.

Frascos x 100 ml.

REGISTRO: 2B1-1896-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.