

TAMOX®



Amoxicilina de larga acción Oral



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Amoxicilina (trihidrato estéril)	200 mg
Estearato de Aluminio.....	17 mg
Excipiente c.s.p.	1 ml

PROPIEDADES: TAMOX amoxicilina de amplio espectro contra gérmenes sensibles tanto Gram-positivos y Gram-negativos.

Su composición y concentración le permite ejercer una efectiva acción durante 48 horas siendo esto una ventaja con relación al tratamiento convencional de aplicación diaria.

INDICACIONES: Infecciones de las vías respiratorias, infecciones del tracto gastrointestinal y urogenital, infecciones dermatológicas y abscesos, infecciones generales, septicemias, infecciones de las articulaciones y del ombligo en terneros, infecciones de las pezuñas, complejo MMA, erisipela.

DOSIS Y VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Aplicar por vía INTRA-MUSCULAR profunda a razón de 15 mg/kg de peso (1 ml/10 kg). Son suficientes 2 administraciones con 48 horas de intervalo. Debe agitarse bien el frasco antes de usar el producto.

TIEMPO DE SUPRESIÓN:

Tejidos comestibles: Bovinos, cerdos, terneros: 14 días después de la última aplicación.

Leche: 2 días después de la última aplicación.

PRESENTACIONES:

Frasco x 30 ml.

Frasco x 100 ml.

Frasco x 250 ml.

REGISTRO: 2C1-10098-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: VETANCO (ARGENTINA) BAJO LICENCIA TADEC.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035