

TIAMULINA FARBIOVET



Antibiótico
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Tiamulina	95 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicada en aves y en cerdos para el tratamiento y control de enfermedades crónicas respiratorias y aquellas relacionadas con *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma sinoviae*, *M. meleagridis*, *M. hyopneumoniae*, *Pasteurella* spp., *E. coli*, también presenta actividad en contra de *Treponema hyodysenteriae*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Streptococcus* sp.

DOSIS:

Aves y Cerdos: 160 a 200 mg/kg de alimento por día. Administrar de 208 a 260 g/tonelada de alimento.

CONTRAINDICACIONES: Está contraindicado en casos que presenten hipersensibilidad a Tiamulina. Antagonismo químico con B-lactámicos. No administrar junto a ionóforos como salinomocina, Lasalocida, Narasina y Monensina, ya que puede generar síndrome neurológico grave. Presenta incompatibilidad con cloranfenicol, eritromicina y algunas drogas a base de sulfas, ya que interfieren con su metabolismo.

ADVERTENCIAS: No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. Una vez realizada la mezcla con el alimento, esta debe consumirse totalmente.

REACCIONES ADVERSAS: Los efectos adversos que se producen con esta droga a las dosis usuales se consideran poco probables. Rara vez, se ha observado eritema, principalmente sobre la zona del jamón y la parte inferior del cuerpo. Se recomienda suspender la medicación, dar agua limpia para beber y lavar con agua a presión las áreas involucradas o movilizar a los animales afectados a corrales limpios.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: Los estudios sobre teratogenicidad llevados a cabo en roedores no mostraron efectos teratogénicos a dosis de hasta 300mg/kg.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La Tiamulina no debe administrarse en animales con acceso a alimentos que contienen ionóforos poliéter (ejemplo Monensina, Lasalocida, Narasina o salinomocina) ya que puede producirse efectos adversos.

La Tiamulina no usar en conjunto con las Lincosamidas (clindamicina, Lincomicina, eritromicina, Tilosina) ya que se unen al ribosoma 50S lo cual podría conducir a la disminución de la eficacia por competencia en el sitio de acción.

TIEMPO DE RETIRO: 10 días antes del sacrificio. Huevos: No utilizar en aves reproductoras de huevos para consumo humano.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C a 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Sobre x 1 kg.
Funda dentro de un cartón x 25 kg.

REGISTRO: 2C2-13500-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador