

TICKXAN



Antiparasitario externo
Solución tópica



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Flumetrina	1g
Fluazuron	2,5 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

INDICACIONES: Para el control y tratamiento de ectoparásitos como: garrapatas, piojos y ácaros que afectan a los bovinos, ovinos y caprinos.

USO VETERINARIO.

DOSIS:

Bovinos, ovinos y caprinos: 1 ml/10 kg de peso, equivalente a 1 mg/kg de Flumetrina y 2.5 mg/kg de Fluazuron.

Se recomienda repetir el tratamiento a los 35 días o a criterio del Médico Veterinario, dependiendo del grado de infestación y la prevalencia de los parásitos en el lugar.

APLICACIÓN: Vía tópica, a lo largo de la línea dorsal, desde la cruz hasta la base de la cola.

ADVERTENCIAS:

- A la dosis indicada no presenta contraindicaciones.
- No aplicar sobre piel lesionada ya que puede provocar intoxicación sistémica.
- Durante la aplicación del producto el operador debe usar guantes de látex, no comer ni beber para evitar intoxicaciones.
- Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Venta bajo prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco x 500 ml
Frasco x 1 litro
Galón

REGISTRO: Ecuador Reg. No. RIP-FAR-13

DISTRIBUIDO POR: JAMES BROWN PHARMA

Av. Interoceánica (E28C) Km. 23.5, Sector El Rosal, Barrio La Libertad, Pifo. Quito – Ecuador - PBX: (593-2) 399-7000 - www.jamesbrownpharma.com