

TIFOCOL



Bacterina mixta aviar
Suspensión inyectable



FÓRMULA: Cada ml contiene:

Pasteurella multocida aviar1X10⁸ UFC
Salmonella pullorum1X10⁸ UFC
Salmonella gallinarum1X10⁸ UFC
Vehículo c.s.p1 ml

ESPECIES: Aves.

DOSIS DE TIFOCOL:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
Aves de 9 a 10 semanas	0.5 ml	Subcutánea
Aves mayores a 10 semanas	1.0 ml	Subcutánea

VACUNACIÓN: Para mayor inmunización, revacunar a los 7 días de la primera vacunación, luego cada 6 meses.

INDICACIONES DE USO: TIFOCOL es una bacterina, indicada para la prevención del cólera aviar, tifoidea aviar y pullorosis, enfermedades que causan una alta mortalidad en aves.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD:

Cólera aviar: Enfermedad bacteriana causada por *Pasteurella multocida*. Tiene 3 presentaciones: hiperaguda (bacteremia), aguda (fiebre, disnea, anorexia, diarrea blanquecina, secreción óculo-nasal) y crónica (infección localizada supurativa asociada al sistema respiratorio y músculo esquelético).

Tifoidea aviar: Enfermedad septicémica específica causada por *Salmonella gallinarum*. Cuadros agudos inician con una caída brusca en el consumo de alimento, aves postradas, con plumas erizadas y barbillas pálidas. Otros signos incluyen caída en la producción de huevos y disminución de la fertilidad.

Pullorosis: Enfermedad septicémica causada por *Salmonella pullorum*, afecta principalmente a pollitos recién nacidos. La mortalidad ocurre entre la segunda y tercera semana de edad y puede ser tan alta como un 100%. Los pollitos presentan debilidad, apetito reprimido, crecimiento deficiente, y retraso en el crecimiento. Evidencia de transmisión vertical se observa recién después de la primera semana.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula al sistema inmune para la producción de anticuerpos contra antígenos bacterianos específicos, previniendo la colonización de las bacterias: *Pasteurella multocida* aviar, *Salmonella pullorum*, *Salmonella gallinarum*. Evitando así la presentación del cólera aviar, tifoidea aviar y pullorosis.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Aplicar únicamente en animales sanos.
- TIFOCOL produce aglutininas en la sangre de las aves temporalmente entre 2 o 3 meses lo que obstaculizaría las pruebas de diagnóstico de aglutinación para la diarrea blanca de los pollos.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS:

- En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna.
- No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIONES:

Frasco x 10 ml
Frasco x 20 ml
Frasco x 50 ml
Frasco x 100 ml
Frasco x 500 ml

REGISTRO: 4C-12120-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador