

TRAMICÍN SOLUBLE



Antibiótico de amplio espectro
Oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:
Oxitetraciclina HCl..... 12,5 g
Vehículo c.s.

INDICACIONES: Tratamiento de enfermedades producidas por microorganismos sensibles a la acción de la oxitetraciclina. Se recomienda especialmente en: difteria, neumoenteritis, colibacilosis, pasteurelosis, infecciones respiratorias y cólera aviar.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Administrar por vía oral en dosis de 4 a 8 gramos por cada 50 kg de peso en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caprinos. (1 o 2 sobres por cada 250 kg de peso del animal).

DOSIS DE tramición soluble AVES: Mezclar en el agua de bebida 100 g de tramición soluble por cada 200 litros de agua como tratamiento curativo y 50 g de tramición soluble por 200 litros de agua, como tratamiento preventivo.

tramición soluble debe administrarse en las dosis indicadas cada 24 horas durante 3 a 5 días, de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

PRECAUCIONES:

Tiempo de retiro: Leche 5 días, carne 14 días.

PRESENTACIÓN:

Sobre x 20 g.

REGISTRO: 2C1-8940-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.