

TRICLORFON



Antiparasitario interno y externo
Polvo



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Triclorfón.....	97 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: Está indicado en el tratamiento de parásitos gastrointestinales, ácaros productores de sarna y dermatomicosis en bovinos, equinos, porcinos, ovinos, caprinos y caninos. Administrado externamente, elimina nuche y sarna actuando por contacto, internamente llega al tubo digestivo y actúa sobre los parásitos internos. Preparar soluciones acuosas.

DOSIS:

Aplicación Externa: Vía tópica por aspersión.

En caso de infestación por piojo y *Melophagus* spp. 1 sobre de 15 g de **TRICLORFON** en 10 litros de agua.

Larvas de Moscas (tórsalo, bichera) 1 sobre de 15 g de **TRICLORFON** en 1,5 litros de agua.

Sarna 1 sobre de 15 g de **TRICLORFON** en 0,75 litros de agua.

Aplicación Interna:

Lombrices intestinales, gusano del cuajo del caballo 1 sobre de 15 g de **TRICLORFON** en 150 ml de agua, administrar 5 ml por cada 10 kg p.v.

Para Caninos: Sólo aplicación Externa.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica e interna. La duración del tratamiento según incidencia de la infestación, salvo mejor criterio del Médico Veterinario. Intervalo entre dosis aplíquese 1 sola dosis cada 15 días.

ADVERTENCIAS: Evitar el contacto con los ojos y las membranas mucosas. Evitar la ingestión. No almacenar junto con productos alimenticios. No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada. No administrar en animales débiles o fatigados, no se recomienda su uso en el último tercio de la gestación. Usar guantes cuando va a tratar a un grupo de animales.

REACCIONES ADVERSAS: No se debe administrar a potros de menos de cuatro meses. La toxicidad es en virtud de los efectos de la D-etilcolinesterasa. Los efectos colinérgicos se dividen en nicotínicos y muscarínicos. Muscarínicos: Disnea, broncoconstricción, aumento de secreciones bronquiales, salivación, lagrimeo, miosis, aumento de secreciones gastrointestinales. Nicotínicos: Temblor, espasmos musculares, con la consecuente fatiga de los músculos intercostales esto provoca una disnea aún más marcada.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA:

El producto no debe usarse en hembras gestantes, ni en animales sensibles a la fórmula. No se debe administrar a yeguas en el último mes de gestación.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN:

Ninguna.

TIEMPO DE RETIRO: 14 días antes del sacrificio del animal destinado al consumo humano. En animales de producción de leche el tratamiento debe iniciarse después del ordeño.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Sobre x 15 g.

REGISTRO: 3A-3B-13499-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador