

## TRIMETO TAD - EC®



### Quimioterápico de amplio espectro

*Solución inyectable*



#### COMPOSICIÓN: Cada 1 ml contiene:

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Trimetoprim ..... | 40 mg  |
| Sulfadoxina ..... | 200 mg |

**MODO DE ACCIÓN:** Mientras que las sulfonamidas inhiben la síntesis del ácido fólico de las bacterias en competencia de sustrato con el ácido p-amino benzoico, el trimetoprim suprime la síntesis bacteriana del ácido fólico. Este bloqueo doble impide por completo la proliferación bacteriana (Gram positivas y Gram negativas). Además se obtiene un efecto bactericida por la acción sinérgica de la combinación.

#### INDICACIONES:

**Ganado bovino y terneros:** En caso de bronquitis, neumonía, enteritis, nefritis, metritis, inflamación umbilical, septicemia por coli.

**Cerdos, destetes y lechones:** En caso de bronquitis, neumonía, enteritis, nefritis, metritis, complejo MMA (mastitis-metritis-agalactia) inflamación umbilical, neumonía enzoótica, complejo griposo, y enfermedad de los edemas, septicemia por coli.

#### DOSIS Y USO:

**BOVINOS:** 7 ml por 100 kg p.c. por vía (I.M.).

**Ternero:** 4 ml por 50 kg p.c. por vía (I.M.).

**CERDOS:** 7 ml por 100 kg p.c. por vía (I.M.).

**Destete:** 1 ml por 15 kg p.c. por vía (I.M.).

**Lechón:** 1 ml por 10 kg p.c. por vía (I.M.).

**AVES:** 0.5 ml por 2 kg p.c. por vía (I.M.).

Aplicando la dosis recomendada los niveles sanguíneos terapéuticos persisten más de 24 horas. En casos muy graves una segunda inyección después de 12 horas garantiza niveles antibacterianos por lo menos durante 36 horas.

#### PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml.

Frasco x 100 ml.

**REGISTRO:** 2B1-8175-AGROCALIDAD.

**ELABORADO POR:** DUTCH FARM INT. - HOLANDA

**DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR:** TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.

Servicio al cliente: +593 32-855 035