

TRIMETO TAD POLVO 48%



Polvo para administración oral



COMPOSICIÓN: 1 kg contiene:

Trimetoprima 80,0 g
 Sulfadiazina sódica
 (equivalente a 400 g de Sulfadiazina) 435,2 g

MODO DE ACCIÓN: Mientras que las sulfonamidas inhiben las síntesis del ácido fólico de las bacterias, en competencia de sustrato con el ácido p-aminobenzóico, el trimetoprim suprime la síntesis bacteriana del ácido folínico.

Este bloqueo doble impide por completo la proliferación bacteriana (gram + y gram -). Además se obtiene un efecto bactericida por la acción sinérgica de la combinación.

Esta potenciación especialmente es efectiva cuando la relación entre sulfonamidas y trimetoprim es de 5:1.

INDICACIONES: Tratamiento de enfermedades infecciosas causadas por agentes patógenos sensibles a Trimetoprim y Sulfadiazina: infecciones primarias y secundarias del tracto respiratorio, gastrointestinal y urogenital, infecciones dermatológicas.

En aves: Infecciones del tracto respiratorio, digestivo, urogenital especialmente *E. coli*, *Salmonella*, *Pasteurella* y especies de *Haemophilus*.

Al uso del producto debe anteceder un antibiograma.

CONTRAINDICACIONES:

- Disfunciones hepáticas y renales graves.
- Alteración del sistema hematopoyético.
- Hipersensibilidad frente a sulfonamidas.
- Catarata.
- No administrar en rumiantes adultos.

EFFECTOS COLATERALES:

- En perros aisladamente puede observarse hepatitis, así como alergias.
- Debe tenerse en cuenta el desarrollo de una catarata en casos de administración prolongada.

DOSIS Y USO DE TRIMETO TAD POLVO 48%:

AVES	30 mg/kg de peso vivo	Durante 3 – 5 días
CERDOS	20 kg de peso	1,2 kg/ton de alimento
	50 kg de peso	1,5 kg/ton de alimento
	60-90 kg de peso	1,8 kg/ton de alimento

FÓRMULA:

Promedio del peso (kg) x 0,06249
 _____ = kg de Trimeto TAD polvo 48% / ton. de alimento
 Consumo de pienso/animal/día (kg)

Para evitar daños renales por cristales en la orina debe proporcionarse líquido suficiente.

Eventualmente la orina puede tornarse alcalina.

Tiempo de supresión: 10 días para tejidos comestibles.

Almacenaje: Seco y fresco hasta 25°C, protegido del sol.

Guardar fuera del alcance de los niños

PRESENTACIONES:

Sobre x 10 g en dispensador x 50 unidades
 Sobre x 100 g
 Funda x 1 kg
 Saco x 25 kg

REGISTRO: 2B1-8678-AGROCALIDAD