

TROYANO ESTIMULANTE 3P



Suplemento vitamínico, mineral con aminoácidos
Cápsula



COMPOSICIÓN: Cada cápsula contiene:

Núcleo 1

Vitamina A Palmitato.....	300 UI
Vitamina D ₃	30 UI
Vitamina E Acetato.....	1,8 UI
Vitamina B ₁ (Tiamina).....	0,27 mg
Vitamina B ₂ (Riboflavina).....	0,20 mg
Vitamina B ₃ (Niacina).....	0,15 mg
Vitamina B ₆ (Piridoxina).....	0,18 mg
Vitamina B ₁₂ (Cianocobalamina).....	0,0005 mg
Vitamina C.....	0,3 mg
Pantotenato de Calcio.....	0,45 mg
Sulfato Ferroso.....	1,38 mg
Sulfato de Magnesio.....	1,44 mg
Sulfato de Manganeso.....	1,42 mg
Cloruro de potasio.....	1,03 mg
Sulfato de Zinc.....	1,03 mg

Núcleo 2

Ácido Glutámico.....	20 mg
L-Serina.....	5 mg
L-Histidina.....	2 mg
L-Glicina.....	1,7 mg
L-Treonina.....	3,5 mg
L-Alanina.....	3,5 mg
L-Arginina.....	3,5 mg
L-Cisteína.....	4,5 mg
L-Valina.....	4,5 mg
L-Metionina.....	2 mg
L-Fenilalanina.....	2 mg
L-Isoleucina.....	8 mg
L-Leucina.....	5 mg
L-Lisina.....	6 mg
DL-Carnitina.....	3,5 mg
Ácido Aspártico.....	1,7 mg

Núcleo 3

Cafeína.....	50 mg
Paracetamol.....	25 mg

INDICACIONES: Son cápsulas multivitamínicas que contienen aminoácidos y minerales un suplemento alimenticio que en conjunto estimulan el desempeño en las actividades diarias de las aves de combate, contiene además paracetamol y cafeína lo cual permite la estimulación del metabolismo y con esto un alto rendimiento en las condiciones físicas.

DOSIS: 1 cápsula diaria durante 10 días antes del combate, salvo mejor criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes.

Está contraindicado en animales con hipervitaminosis.

No se produce ningún efecto adverso atribuible al producto, sin embargo en raras ocasiones puede provocar sensibilidad a uno de los componentes, en este caso administrar algún antihistamínico, en cuanto a antagonismos farmacológicos no posee ninguno e incompatibilidades tampoco.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No se han reportado para vitaminas.

ADVERTENCIAS: Use guantes, especialmente cuando tratará a un grupo de animales.

No se recomienda en otra especie que no sea la autorizada.

REACCIONES ADVERSAS: Si se aplica la dosis recomendada y en las especies autorizadas no debería presentarse reacciones adversas.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIÓN:

Caja x dos blisters conteniendo 6 cápsulas cada uno.

REGISTRO: 8B1-14221-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador