

TRUXX



Antibiótico
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Tulatromicina 10 g
Vehículo c.s.p 100 ml

INDICACIONES: Antibacteriano de amplio espectro para el tratamiento de la enfermedad respiratoria bovina asociada con *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Histophilus somni* (*Haemophilus somnus*), y *Mycoplasma bovis*; para el control de la asociación con *M. haemolytica*, *P. multocida*, *H. somni*, y *M. bovis*; y para el tratamiento de queratoconjuntivitis infecciosa bovina asociada con *Moraxella bovis*. Para el tratamiento de la enfermedad respiratoria porcina asociada con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Haemophilus parasuis* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.

DOSIS: Bovinos y Porcinos: Dosis única 1 ml por cada 40 kg de peso, dosis diaria (2,5 mg/kg). Se recomienda en bovinos administrar no más de 10 ml por punto de inyección. Se recomienda en porcinos administrar no más de 2,5 ml por sitio.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Subcutánea.

ADVERTENCIAS: No usar en animales con hipersensibilidad a antibióticos macrólidos. No usar el producto simultáneamente con otros macrólidos o lincosamidas. No usar en vacas en lactación cuya leche se destine para consumo humano. No usar en novillas o vacas preñadas que estén destinadas a la producción de leche para consumo humano, durante los dos meses previos a la fecha prevista del parto.

REACCIONES ADVERSAS: La inyección SC puede causar una reacción tisular local transitoria que puede dar lugar a la pérdida de pelo en la zona.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: La seguridad en reproducción y lactancia es desconocida.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: No usar simultáneamente con otros macrólidos o lincosamidas.

TIEMPO DE RETIRO:

Bovinos: 18 días.

Porcinos: 5 días.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Viales x 1 ml

Caja con 14 unidades x 1 ml.

Viales x 5 ml

Viales x 10 ml

Viales x 50 ml

REGISTRO: 1C-14070-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador