

TYLAN® 100



Mejorador de eficiencia alimenticias
Oral



COMPOSICIÓN: Ingrediente Activo

Tilosina (como Fosfato)100 g
Excipientes para 1 000 g

INDICACIONES:

Pollos de engorde:

Para incrementar la ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimenticia.

- 110 a 220 gramos de **TYLAN® 100** por 1 000 kg de alimento (11 a 22 ppm) durante el período de vida del pollo.

Para la prevención y control de la ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA (Aerosaculitis) causada por *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*.

- 8.8 a 11 kg de **TYLAN® 100** por 1 000 kg de alimento (880 a 1 100 ppm) durante los primeros 5 días de edad.

Repetir el tratamiento por 2 días durante la tercera a quinta semana.

Ponedoras:

Para mejorar la eficiencia alimenticia. Para incrementar la producción de huevos y mejorar la eficiencia alimenticia a través del control del *Mycoplasma gallisepticum*.

- 220 a 550 gramos de **TYLAN® 100** (22 a 55 ppm) por 1 000 kg de alimento. Suminístrese durante todo el período de producción.

Aves de levante:

Para la prevención, tratamiento y control de la ENFERMEDAD RESPIRATORIA CRÓNICA (Aerosaculitis) causada por el *Mycoplasma gallisepticum* y *Mycoplasma synoviae*.

- 8.8 a 11 kg de **TYLAN® 100** por 1 000 kg de alimento (880 a 1 100 ppm) durante los primeros 5 días de edad. Repetir el tratamiento por 2 días durante la tercera a quinta semana de edad.

Cerdos:

Para incrementar la ganancia de peso y mejorar la eficiencia alimenticia. Para mantener la ganancia de peso y la eficiencia alimenticia en presencia de neumonía enzoótica y rinitis atrófica. Para la prevención, tratamiento y control de la disentería hemorrágica.

- Mezcle 1.1 kg de **TYLAN® 100** por 1 000 kg (110 ppm) durante tres semanas, seguido por 0.44 kg de **TYLAN® 100** (44 ppm) hasta lograr el peso requerido.

Para la prevención y/o control de las Enteropatías Porcinas Proliferativas (Ileitis) asociadas con la *Lawsonia intracellularis*.

- Mezcle 1.1 kg de **TYLAN® 100** por 1 000 kg (110 ppm) durante tres semanas.

Ganado:

Para incrementar la ganancia de peso, mejorar la eficiencia alimenticia y reducir la incidencia de abscesos hepáticos en Ganado de carne causado por *Fusobacterium necrophorum* y *Actinomyces pyogenes*.

Mezcle la cantidad suficiente de **TYLAN® 100** en el alimento para proveer no menos de 50 mg ni más de 100 mg de actividad de Tilosina por animal por día.

IMPORTANTE: Debe ser mezclado cuidadosamente en el alimento antes de usarse.

TIEMPO DE RETIRO: 5 días.

ADVERTENCIAS: El producto debe ser manipulado con guantes y máscara, cuando se vaya a efectuar el proceso de mezclado y cuando se maneje la premezcla antibiótica. Los operadores deben

lavarse muy bien después de haber manejado el producto.

No lo use en alimento terminado (suplemento, concentrado o alimento completo) conteniendo en exceso de 2% de bentonita.

MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en lugar fresco y seco. Evite la humedad y el calor excesivo.

ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO DESPUÉS DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN IMPRESA EN EL SACO.

PRESENTACIÓN:

Saco x 25 kg.

REGISTRO: 2C1-1633-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO