

TYLAN® SOLUBLE



Antimicrobiano
Oral



COMPOSICIÓN:

Tartrato de tilosina 100%

INDICACIONES: Útil en el tratamiento de la Enfermedad Respiratoria Crónica causada por *Mycoplasma gallisepticum* en los pollos parrilleros, pollas de reposición, gallinas reproductoras y para la sinusitis de los pavos o para la prevención de la E.R.C., en el momento de las vacunaciones y otras causas de estrés.

DOSIFICACIÓN: Disolver el contenido del envase en 2 000 litros de agua. Pollos de 1 a 7 días de edad deberán consumir la cantidad suficiente de agua, para obtener 35 mg de **TYLAN® SOLUBLE** durante los tres días del tratamiento. Pollos mayores de una semana de edad deberán recibir 110 mg de **TYLAN® SOLUBLE** por kg de peso vivo por día. Los pavos deberán ser tratados a una concentración de 0.5 g de **TYLAN® SOLUBLE** por cada 2.2 kg de peso por día.

INSTRUCCIONES DE USO: TYLAN® SOLUBLE: Cómo hacer la mezcla: Para asegurar una disolución rápida y total, colóquese **TYLAN®** (el contenido total de este envase) en un recipiente apropiado y agréguese 40 litros de agua al polvo de **TYLAN®**. Agítese para disolver. Mézclese esta solución concentrada con agua para hacer 2 000 litros de agua medicada para beber, agítese bien. Prepárese una solución fresca de **TYLAN®** cada 3 días. Añádase siempre el agua al polvo no agregue el polvo sobre el agua. Para bebederos dotados con proporcionadores automáticos. Se puede preparar una solución concentrada de **TYLAN® SOLUBLE**, disolviendo el contenido total de este envase en 15 litros de agua tibia. Agréguese 30 ml de esta solución concentrada por cada 4 litros de agua de bebida. Para medicar bebederos de 4 litros, úsen-se 30 ml (2 cucharadas soperas aproximadamente) de la solución concentrada.

MEDICACIÓN PREVENTIVA: Los pollitos deberán ser tratados los 3 primeros días de vida. Repita el tratamiento por 1 o 2 días a la 4ª semana de vida, para que coincida con la vacunación de un virus vivo o cualquier otra causa de estrés. Los pavos deberán ser tratados durante los 5 primeros días de vida. Repita el tratamiento por 48 horas a la 4ª semana de vida.

MEDICACIÓN TERAPÉUTICA:

Pollos: Deberán ser tratados durante 3 días, no obstante, el tratamiento puede ser aplicado de 1 a 5 días, dependiendo de la gravedad de la infección.

Pavos: Deberán ser tratados durante 3 días, no obstante, el tratamiento puede ser aplicado de 2 a 5 días, dependiendo de la gravedad de la infección. Si no se observa mejoría dentro de los 5 días, se deberá confirmar el diagnóstico.

ADVERTENCIAS: No usar en ponedoras cuya producción esta destinada a consumo humano.

PRECAUCIONES: Evitar el contacto con la piel. La exposición a la Tilosina puede causar irritación.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ESTE PRODUCTO NO DEBE SER USADO DESPUÉS DE LA FECHA DE EXPIRACIÓN IMPRESA EN EL ENVASE.

El contenido de este envase de **TYLAN® SOLUBLE** es suficiente para medicar 30 000 pollitos durante los 3 primeros días de vida o 23 000 pollos de 4 semanas de edad durante 24 horas.

PERÍODO DE RETIRO: Los aves, pavos inclusive, tratadas con

agua medicada, no deberán ser sacrificadas para el consumo humano, dentro de los 5 días siguientes al tratamiento.

ALMACENAMIENTO: Almacénese en lugar fresco y seco a una temperatura no mayor a 25°C.

PRESENTACIÓN:

Bolsa x 1 kg.

REGISTRO: 2C1-389-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: ELANCO