

TYLOFAR POLVO



Antibiótico de amplio espectro
Polvo oral



COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Tilosina Tartrato	87 g
Paracetamol	3 g
Excipientes c.s.p.....	100 g

INDICACIONES: La Tilosina Tartrato es un antibiótico de amplio espectro en aves y cerdos para el tratamiento de *Mycoplasma gallisepticum* y *meleagridis*, *Diplococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*, *Corynebacterium diphtheriae*, *Clostridium* spp. En Cerdos la tilosina es utilizada para el tratamiento de micoplasmosis, disentería porcina, prevención de enteritis.

DOSIS DE TYLOFAR POLVO:

TYLOFAR POLVO	Aves	Cerdos
	Solubilizar en: litros de agua de bebida.	
1 sobre de 4 g	4 l	30 l
1 sobre de 10 g	10 l	75 l
Se recomienda de 3 a 5 días dependiendo de la enfermedad a tratar.		

PREPARACIÓN: Polvo que se mezcla directamente en el agua de bebida de las aves y cerdos. Se sugiere hacer restricciones de agua y administrar el fármaco en forma de pulsos para que la dosis sea consumida totalmente.

CONTRAINDICACIONES: Puede causar edema de la mucosa rectal, protrusión, diarrea y prurito en algunos lechones. Se recomienda en esos casos suspender el tratamiento. Reacciones adversas, inclusive shock y muerte pueden resultar de una sobredosis en lechones.

ADVERTENCIAS: En caso de presentarse diarrea y prurito en lechones. Se recomienda en esos casos suspender el tratamiento. No sobredosificar lechones puede presentarse reacciones adversas, inclusive shock y muerte del animal. No usar en caballos.

REACCIONES ADVERSAS: La tilosina puede inducir grave diarrea, si se administra por vía oral a los ruminantes o por cualquier vía en equinos. En los porcinos, los efectos adversos descritos incluyen edema de la mucosa rectal y leve prostración anal con prurito, eritema y diarrea.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: No administrar en aves de postura, porque el huevo puede adquirir concentraciones altas del antibiótico. No administrar en animales que este cerca del término de su preñez.

INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: Se potencia con tetraciclinas y suma efectos con sulfonamidas. La Tilosina es antagonista con betalactámicos, con Lincomicina y Clindamicina.

TIEMPO DE RETIRO: Carne: Aves 5 días y Cerdos 14 días. No utilizar en gallinas de postura para plato.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura no mayor de 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Venta Bajo Receta Médica.

PRESENTACIONES:

Fundas x 4 g.
Fundas x 100 g.

REGISTRO: 2C1-12268-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIO PHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador