

TYLOTAD-EC®



Polvo soluble



COMPOSICIÓN: Cada kg contiene:

Tylosin Tartrato 100 g
Doxiciclina Clorhidrato 200 mg
Excipiente c.s.p.

INDICACIONES: TYLOTAD-EC está indicado para el tratamiento y control de infecciones producidas tanto por gérmenes Gram negativos como por Gram positivos tales como: *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma sinoviae*, *Mycoplasma pneumoniae*, Disentería en cerdos (*Treponema hyodisenteriae*), *Haemophilus* spp.

La asociación Tylosina-Doxiciclina provee un sinergismo que permite lograr un efectivo control de los agentes patógenos sensibles.

DOSIS: 2 gramos por litro de agua de bebida durante 3 - 5 días. Luego de vacunaciones de Newcastle o Bronquitis administrar la misma dosificación por 2 días. En casos severos de Micoplasmosis administrar consecutivamente de 3 a 5 días.

TIEMPO DE RETIRO

Carne: 5 días.

Huevos: 4 días.

ALMACENAJE:

Almacenar entre 15° a 25° C.

PRESENTACIONES:

Caja de 50 sobres x 20 g.

Sobre x 100 g.

Tarro x 1 kg.

REGISTRO: 2C1-10027-AGROCALIDAD.

PRODUCIDO POR: DUTCH FARM INT. - HOLANDA

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035