

UNI WALL MOS 25



Acidificante y prebiótico con paredes de Mananooligosacáridos
Polvo oral



UNI WALL MOS® es un prebiótico responsable de mejorar la inmunidad del tracto digestivo a través de los mananooligosacáridos (MOS), siendo estos también sustratos para las bacterias benéficas para su multiplicación en el intestino.

Los mananooligosacáridos también tienen la capacidad de fijar bacterias patógenas por adsorción, evitando la colonización del tracto digestivo.

UNI WALL MOS® posee una mezcla de ácidos orgánicos (ácido acético, formiato de amonio, ácido fórmico y propionato de amonio) unido a un "Carrier" mineral (polvo de diatomeas) lo que permite una liberación a lo largo de todo el tracto digestivo.

El vehículo mineral también permite la colonización de bacterias benéficas acidófilas debido a la diferencia de pH durante la primera porción del intestino delgado, y llevando estas bacterias acidófilas consigue continuar dentro del tracto digestivo hasta el intestino grueso, ayudando a controlar un pH ligeramente acidófilo por la producción de ácidos de las propias bacterias benéficas colonizadas. Esta diferencia en el pH intestinal permite favorecer la colonización de una flora benéfica acidófila en lugar de bacterias patógenas que demandan un pH neutro o ligeramente alcalino.

Este mecanismo de acción, estimulando la proliferación de bacterias ácido lácticas del tracto digestivo, es fundamental en el arranque de lechones destetados y aves en todas sus etapas, favoreciendo la salud intestinal y consecuentemente la absorción de nutrientes, lo que debe manifestarse en una mayor conversión y salud de lechones destetados y aves.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g contiene:

Pared de levaduras (manano oligosacáridos y betagluconos).....	25 g
Formiato de amonio.....	10.30 g
Ácido fórmico.....	5.15 g
Propionato de amonio	3.43 g
Ácido acético	0.86 g
Agua	12.00 g
Polvo de diatomeas c.s.p.....	100.00

COMO ACTÚAN LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS:

1. Disminuyen el pH digestivo favoreciendo el desarrollo de bacterias ácido lácticas.
2. Penetran la pared lipoprotéica de las bacterias gran negativas por difusión, alterando la síntesis de DNA y enzimas produciendo su acción bactericida.

COMO ACTÚAN LOS MOS:

- Adhesión de las Bacterias Patógenas.
- Capacidad Prebiótica.
- Capacidad de Neutralizar Micotoxinas.
- Capacidad Inmunoestimulante.

ESPECTRO DE ACCIÓN ANTIBACTERIANA: La acción combinada de los componentes de **UNI WALL MOS®** desarrolla su acción contra bacterias de amplia difusión en la industria avícola. *Salmonella* spp., *Escherichia coli*, *Campilobacter jejuni*, *Staphylococcus* sp., *Clostridium* sp. (indirectamente a través de la promoción de *Lactobacillus* sp.).

EFFECTOS COMPLEMENTARIOS: También se ha comprobado que el uso de Pared de Levaduras a nivel intestinal:

- Disminuye el grosor de la mucosa intestinal mejorando absor-

ción de nutrientes.

- Aumenta la longitud de las vellocidades.

Todo esto resulta en una mejora de los resultados productivos.

UTILIZACIÓN EN LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y PORCINA:

1. Reemplazo natural de los promotores de crecimiento antibióticos en alimentación avícola, recría, crecimiento y terminación en cerdos.
2. Control y prevención de enfermedades entéricas en aves y lechones.
3. Programas preventivos de Salmonella y Escherichia en aves reproductoras, ponedoras y cerdos.
4. Disminución de la carga bacteriana en animales y alimentos.

DOSIFICACIÓN: kg/Tonelada de alimento.

1 a 2 kilos por tonelada de alimento.

CERDOS:

Starter: 750 g/Tn.

Recría: 500 g - 750 g/Tn.

Hembras gestantes y Lactantes: 750 g - 1 kg/Tn.

POLLOS DE ENGORDE:

	Pollos de Engorde	Reproductoras pesadas	Ponedoras
Fases Iniciales	1 kg/Tn	1.5 kg/Tn	1.5 kg/Tn
Fases de engorde	1 kg/Tn	----	---
Producción (Postura)	---	1 kg/Tn	1 a 1.5 kg/Tn

REGISTRO: 1F-14342-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: VETANCO (ARGENTINA) BAJO LICENCIA TADEC.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035