

VACUNA COLERA AVIAR



Bacterina para prevenir el cólera o Pasterelosis aviar
Vía intramuscular o subcutánea



COMPOSICIÓN: Cada dosis (0.5 ml) contiene:

Los títulos antes de inactivar, para cada serotipo son:

Pasterela multocida serogrupo A serotipo 1 2×10⁹ UFC

Pasterela multocida serogrupo A serotipo 3 2×10⁹ UFC

Pasterela multocida serogrupo A serotipo 4 2×10⁹ UFC

Pasterela haemolytica (*Gallibacterium anatis*)

serotipo local 2×10⁹ UFC

Excipientes c.s.p. 1 dosis

GENERALIDADES: El Cólera aviar también llamado cólera de las aves, Pasterelosis aviar o Septicemia hemorrágica aviar, es una enfermedad infecciosa de tipo septicémico, ocasionada por *Pasterela* spp., que causa disminución de la postura y fertilidad de los huevos incubables. Para disminuir las pérdidas económicas que conlleva la aparición de un brote de cólera aviar, es importante una perfecta profilaxis mediante vacunación y bioseguridad.

PROPIEDADES: La calidad y eficacia de la vacuna se basa en: *Pasterela multocida* y *Pasterela haemolytica* (*Gallibacterium anatis*), es una cepa de campo altamente patógena y seleccionada por su alta antigenicidad e inmunogenicidad.

El gel de hidróxido de aluminio permite una dispersión homogénea del antígeno en la aplicación, reduce el impacto de la reacción post-vacunal, además permite una continua y duradera estimulación del sistema inmune.

INDICACIONES: Para la prevención de Cólera aviar en gallinas de postura y reproductoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Aplique por vía intramuscular en la pechuga, muslo o por vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

DOSIS:

Primera dosis: Aplicar 0,5 ml por ave, entre 8 - 12 semanas de edad.

Segunda dosis: 4 - 6 semanas después de la primera aplicación. Se recomienda una tercera dosis en áreas de múltiples edades, de alto desafío y en lotes que entren a muda forzada.

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

PRECAUCIONES:

- Vacunar solo aves sanas.
- Mantenga en refrigeración entre 3 ° C y 7 ° C.
- No congelar.
- No exponga a la luz solar.
- Agitar el producto antes de usar.
- Una vez abierto el frasco, use todo el contenido.
- Destruir los frascos y residuos de vacunas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:

Frasco x 50 (25 ml)

Frasco x 100 (50 ml)

Frasco x 1 000 dosis (500 ml)

REGISTRO:

COLOMBIA: ICA N ° 8529- BV

ECUADOR: 4A – 10101-AGROCALIDAD