

## VACUNA CORIMUNE



**Bacterina para prevenir la Coriza infecciosa**  
Vía intramuscular y subcutánea



**COMPOSICIÓN:** Cada 0.5 ml (1 dosis) contiene:

Títulos antes de inactivar *Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum*:

Serotipo A.....	2x10 <sup>9</sup> UFC
Serotipo B.....	2x10 <sup>9</sup> UFC
Serotipo C.....	2x10 <sup>9</sup> UFC
Serotipos locales de <i>Avibacterium paragallinarum</i> .....	2x10 <sup>9</sup> UFC
UFC Excipientes c.s.p.....	1 dosis

**GENERALIDADES:** La Coriza Infecciosa, es una enfermedad de las vías respiratorias altas, causada por la bacteria *Avibacterium paragallinarum* que afecta a aves de todas las edades. Esta enfermedad causa grandes pérdidas económicas, disminuyendo la producción de huevos hasta un 40 %; el consumo de alimento y agua disminuye por el estado febril de las aves.

**PROPIEDADES:** Los serotipos que contiene la vacuna **CORIMUNE**, han sido seleccionados por sus características genotípicas y su capacidad esencial de estimular anticuerpos multivalentes, para los serotipos contenidos.

**La calidad y eficacia de la vacuna se basa en:**

- El gel hidróxido de aluminio utilizado en la vacuna le proporciona una alta capacidad inmunogénica y lenta adsorción.
- Los excelentes resultados en la profilaxis de campo, donde antiguos programas vacunales han fallado, debido en gran parte a los cambios en la tipificación de la bacteria, como respuesta a la presión inmunológica y evolución biológica natural de los gérmenes infecciosos.
- El uso y reformulación con otros serotipos que afectan a las granjas.

**INDICACIONES:** Para la prevención de Coriza Infecciosa en gallinas de postura y reproductoras.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Aplique por vía intramuscular en la pechuga, muslo o por vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

**DOSIS:**

**Primera dosis:** Aplicar 0,5 ml por ave, entre 8 - 12 semanas de edad.

**Segunda dosis:** 4 - 6 semanas después de la primera aplicación. Se recomienda una tercera dosis en áreas de múltiples edades, de alto desafío y en lotes que entren a muda forzada.

**TIEMPO DE RETIRO:** No tiene.

**PRECAUCIONES:**

- Vacunar solo aves sanas.
- Mantenga en refrigeración entre 3 ° C y 7 ° C.
- No congelar.
- No exponga a la luz solar.
- Agitar el producto antes de usar.
- Una vez abierto el frasco, use todo el contenido.
- Destruir los frascos y residuos de vacunas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIONES:**

- Frasco x 1 000 dosis (500 ml)
- Frasco x 200 dosis (100 ml)

**REGISTRO:**

**COLOMBIA:** ICA N ° 5532- DB

**ECUADOR:** 4C-9867-AGROCALIDAD

**FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:** LAVETEC CÍA. LTDA.