VACUNA GUMBOLAV

Vacuna para prevenir la enfermedad de Gumboro o Bursitis infecciosa
Vía oral

COMPOSICIÓN: Cada dosis contiene mínimo:
Virus vivo de Gumboro, cepa Lukert .....$1x10^4$ DIE 50 %
Estabilizadores c.s.p..... 1 dosis

GENERALIDADES: La enfermedad de Gumboro o Bursitis Infecciosa, es causada por un virus muy contagioso de la familia *Birnaviridae*, afectando a la bolsa de Fabricio, produciendo inmunosupresión, aumentando la susceptibilidad a infecciones por otros agentes; disminuyendo la respuesta a las vacunas y los índices productivos.

PROPIEDADES: La cepa Lukert intermedia confiere inmunidad contra esta enfermedad en presencia de anticuerpos maternos, induciendo una óptima respuesta inmune.

INDICACIONES: Para la prevención de la enfermedad de Gumboro en pollos de engorde, pollas de reemplazo y pollonas reproductoras.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: La vacuna puede ser administrada por vía oral.

VÍA ORAL: Vierta la vacuna en el agua de bebida, luego de prepararla de acuerdo a la siguiente tabla:

EDAD/DÍAS	LITROS/1 000 AVES
7	10
21	15
28	30
56	50

La administración por esta vía, debe ir acompañada de la adición de productos estabilizadores especializados, como Provir (protector viral) y Neutrovet (neutralizante), para proteger al virus y mantener el pH 6.8 a 7.2.
Es importante suspender durante 1 hora el agua de bebida; así, se logrará que ingieran rápidamente la vacuna.

DOSIS:
Primera dosis: Vacunar aves a los 7-10 días de edad.
Segunda dosis: Revacunar a los 13-18 días de edad.
Revacunación: Se recomienda revacunar para lograr una mejor y duradera inmunidad; repetir las dosis según criterio profesional. La cantidad de agua dosificada con la vacuna usualmente es de 15 – 20% de la cantidad de agua consumida el día anterior.

TIEMPO DE RETIRO: No tiene.

PRECAUCIONES:
- Vacunar solo aves sanas.
- Mantenga en refrigeración entre 3 ° C y 7 ° C.
- No congelar.
- No exponga a la luz solar.
- Utilice inmediatamente la vacuna después de ser preparada.
- Destruir los frascos y residuos de vacunas.
- Suspender el uso de desinfectantes en el agua de bebida, 24 horas antes y 24 horas después de la vacunación.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES:
Frasco x 50 dosis (3.2 ml)
Frasco x 100 dosis (6.4 ml)
Frasco x 1 000 dosis (37 ml)
Frasco x 2 500 dosis (97 ml)
Frasco x 5 000 dosis (195 ml)
Diluyente incluido

REGISTRO: 4 A-14253-AGROCALIDAD

FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR: LAVETEC CÍA. LTDA.