

## VACUNA HEPATOINMUNE



### Vacuna inactivada para prevenir el Síndrome de hepatitis a cuerpos de inclusión e hidropericardio

Vía intramuscular o subcutánea



**COMPOSICIÓN:** Cada dosis (0,25 ml) de vacuna contiene:

Aislados locales de Adenovirus del serotipo 4 y 8 .....1x10<sup>8,5</sup> DIE 50 %  
Excipientes c.s.p..... 1 dosis

**GENERALIDADES:** El síndrome de Hepatitis a cuerpos de inclusión e hidropericardio, es una enfermedad causada por Adenovirus aviares. El virus en Ecuador fue aislado y caracterizado como serotipo 4 y 8.

**PROPIEDADES:** Vacuna inactivada adsorbida en gel de hidróxido de aluminio, para inducir una rápida y prolongada respuesta inmune, sin causar efectos post -vacunales, por su adyuvante que es acuoso y no oleoso.

**INDICACIONES:** Recomendada para prevenir la infección en aves jóvenes (pollos de engorde y pollonas de reemplazo); así como para limitar la transmisión vertical en reproductoras e inducir la transferencia de anticuerpos maternos a la progenie.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Aplique por vía intramuscular en la pechuga, muslo o por vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

**DOSIS:** En aves jóvenes (pollos y pollas) dentro de la primera semana (4-7 días), se recomienda una dosis de 0,25 ml en pollos y 0,50 ml para pollas de reemplazo.

En aves de reemplazo para proteger en producción, aplicar entre 7 a 10 semanas de edad la primera dosis y entre las 14 a 16 semanas la segunda dosis.

**TIEMPO DE RETIRO:** No tiene.

**PRECAUCIONES:**

- Vacunar solo aves sanas.
- Mantenga en refrigeración entre 3 °C y 7 °C.
- No congelar.
- No exponga a la luz solar.
- Agitar el producto antes de usar.
- Una vez abierto el frasco, use todo el contenido.
- Destruir los frascos y residuos de vacunas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIONES:**

Frasco x 1 000 dosis (500 ml) pollas de reemplazo.  
Frasco x 1 000 dosis (250 ml) pollos de engorde.

**REGISTRO:** 4 A -5886-AGROCALIDAD.

**FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:** LAVETEC CÍA. LTDA.