

## VACUNA SALMONELLA 9R



**Para prevenir Salmonelosis o Tifosis aviar**  
Vía subcutánea



**COMPOSICIÓN:** Cada 0.5 ml (1 dosis) contiene mínimo:  
*Salmonella gallinarum* cepa 9R..... 25x10<sup>8</sup> UFC  
Excipientes c.s.p..... 1 dosis

**GENERALIDADES:** La Tifosis aviar y Pullorosis son enfermedades específicas de las aves, causadas por dos biovariedades de *Salmonella gallinarum* y *pullorum*. Estos microorganismos presentan una estructura antigénica similar, pero pueden diferenciarse mediante pruebas bioquímicas.

La *S. gallinarum* se transmite rápidamente a aves sanas, por vía vertical y horizontal, siendo esta última la más rápida para el contagio de las aves.

Por esta razón deben tomarse las precauciones sanitarias necesarias, para minimizar la transmisión. Los vectores más comunes de transmisión son los roedores, aves silvestres, insectos y el hombre principalmente.

**RECOMENDACIONES:**

- Cumplir normas de bioseguridad.
- Adquisición de aves libres de la enfermedad.
- Mantener aves libres de la enfermedad, desde su llegada hasta su consumo.
- Aplicación de probióticos, prebióticos, acidificantes y otros que ayudan al control de esta enfermedad.
- Aplicar biológicos de calidad y calendarios adecuados.
- Control integrado de plagas.

**PROPIEDADES:** Las investigaciones a nivel mundial demuestran que la vacuna viva 9R de *Salmonella gallinarum* es útil en el control de tifosis aviar (salmonelosis).

**INDICACIONES:** Recomendado para la prevención de la tifosis aviar en gallinas de postura.

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Vía subcutánea en la parte posterior del cuello.

**DOSIS:** En pollonas de reemplazo se recomienda dos dosis.

**Primera dosis:** 8-10 semanas de edad.

**Segunda dosis:** Entre 12-14 semanas.

**TIEMPO DE RETIRO:** No tiene.

**PRECAUCIONES:** Se recomienda suspender el uso de antibióticos, promotores de crecimiento; por lo menos 5 días antes y 5 días después de la vacunación.

No se recomienda el uso en reproductoras; excepto, si es recomendado por el profesional bajo condiciones especiales de manejo.

- Vacunar solo aves sanas.
- Mantenga en refrigeración entre 3 °C y 7 °C.
- No congelar.
- No exponga a la luz solar.
- Utilice inmediatamente la vacuna después de ser preparada.
- Destruir los frascos y residuos de vacunas.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

**PRESENTACIÓN:**

Frasco x 1 000 dosis con diluyente adjunto (500 ml).

**REGISTRO:** 4A-9869-AGROCALIDAD

**FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR:** LAVETEC CÍA. LTDA.