

VALACK B₁₂

Vitaminas con minerales
Solución inyectable



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

Fosforilcolamina	12,0 g
Dextrosa	5,0 g
Acetato de sodio.....	0,150 g
Cloruro de Calcio.....	0,015 g
Cloruro de Potasio.....	0,020 g
Sulfato de Magnesio.....	0,028 g
L-arginina.....	0,002 g
L-ácido glutámico	0,004 g
L-histidina	0,001 g
L-leucina	0,004 g
L-isoleucina	0,002 g
L-lisina	0,003 g
L-metionina	0,001 g
L-fenilalanina	0,003 g
L-treonina	0,002 g
L-triptófano	0,001 g
L-valina	0,005 g
L-cisteína	0,001 g
Vitamina B ₁	90,0 mg
Vitamina B ₆	18,0 mg
Vitamina B ₁₂	5,45 mg
Vitamina C.....	149,0 mg
Niacinamida.....	541,0 mg
Biotina.....	0,90 mg
Vehículo c.s.p.....	100 ml

INDICACIONES: Es una solución inyectable, formulada a base de fosforilcolamina, un fósforo orgánico natural, con acción reguladora del metabolismo basal, en su fórmula contiene además vitaminas, aminoácidos esenciales y minerales, que ayudan a optimizar las condiciones en la reproducción, fertilidad, alimentación y crecimiento en los animales. En aves mejora la muda del plumaje, la prepara antes del combate, exhibición, muda o postura.

DOSIS DE VALACK B₁₂:

ESPECIE	EDAD	PESO DEL ANIMAL	VOLUMEN (ml)
BOVINOS	Terberos	hasta 60 kg	5 ml
		100-150 kg	10 ml
	Adultos	150-300 kg	15 ml
		300-400 kg	20 ml
EQUINOS	Potrillos	hasta 60 kg	5 ml
	Adultos	350 kg	15 ml
PORCINOS	Pequeños	hasta 50 kg	10 ml
	Adultos	mas de 50 kg	15 ml
OVINOS, CAPRINOS Y CANINOS: 1 ml/10 kg p.v			
AVES: 0,1 ml/2 kg p.v.			
Duración del tratamiento: 3 a 5 días según criterio del Médico Veterinario.			

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea o Intravenosa. En aves Intramuscular.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad alguna de los componentes. En animales con hipervitaminosis.

PRECAUCIONES: No se recomienda en otra especie que no sea

la autorizada.

REACCIONES ADVERSAS: Las reacciones de hipersensibilidad han ocurrido después de inyectar complejo B. Posterior a la inyección IM, puede producirse sensibilidad o dolor muscular.

USO DURANTE LA GESTACIÓN, LA LACTANCIA O LA PUESTA: La deficiencia de vitamina B₁₂ causa efectos teratogénicos. La vitamina B₁₂ puede ser excretada en la leche, es segura mientras se está en lactancia.

TIEMPO DE RETIRO: Ninguno.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz, a temperatura entre 15°C y 30°C. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

DECLARACIÓN DE VENTA: Con prescripción Médico Veterinaria.

PRESENTACIONES:

Viales x 1 ml.
Viales x 20 ml.
Viales x 50 ml.
Viales x 100 ml.
Viales x 250 ml.

REGISTRO: 9B2-2-10998-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador