

VAXXON AE (TREMOR VET)

va 
Biovét



**Vacuna contra la Encefalomiélitis aviar
(Origen de embrión – virus activo atenuado)
USO VETERINARIO**

Líquida – congelada



El virus de la Encefalomiélitis Aviar, es originado de America Type Culture Collection-ATCC VR-713 muestra Van Roekel (adaptado a embrión de gallina).

MODO DE USO Y DOSIS: La aplicación de esta vacuna contra la Encefalomiélitis aviar se realiza sólo a través del agua de bebida. La mejor época para la vacunación de las aves es con la edad de 12 semanas, entretanto, en casos especiales, se pueden vacunar aves de 6 semanas de edad, hasta 4 semanas antes de iniciar a poner huevo. El uso de la vacuna, todavía, podrá ser modificado a discreción del médico veterinario.

PREPARACIÓN DE LA VACUNA PARA AGUA DE BEBIDA: Abrir el frasco de la vacuna, removiendo el sello de aluminio y la tapa de goma. Adicionar todo el contenido en el agua de bebida, limpia, sin cualquier residuo de desinfectante, en un volumen correspondiente a 40 litros, para vacunar 1 000 aves de 12 semanas de edad.

RECOMENDACIONES:

- El agua que va ser utilizada para preparación de la vacuna debe estar libre de desinfectante y detergente y no contener cloro, hierro, nitratos, etc. El uso concomitante con substancias antimicrobianas o antiinflamatorias, por cualquier vía de aplicación podrá interferir en el desarrollo y mantenimiento de la respuesta inmune después de la vacunación;
- Retirar el agua de las aves 2 (dos) horas antes de la vacunación;
- No administrar otra agua de bebida hasta que toda el agua conteniendo vacuna haya sido consumida;
- Suspender el uso de medicamentos y desinfectantes en el agua de bebida 72 (setenta y dos) horas antes y 24 (veinticuatro) horas después de la vacunación;
- En la preparación de la vacuna adicionar 25 g de Lovit blue C por 200 litros de agua;
- Los bebederos deben estar limpios y sin residuos de jabón, detergentes desinfectantes u otros productos químicos que puedan ser nocivos a la vacuna;
- Los bebederos conteniendo la vacuna no deben ser expuestos a la luz solar directa;
- No vacunar aves desnutridas, débiles, con parásitos, con enfermedades intercurrentes (coriza, coccidiosis, verminosis, DCR y otras) o sometidas a cualquier tipo de estrés por ser sensibles al virus y no responder satisfactoriamente a la inmunización;
- Cuidado para evitar contaminación en las manos, ojos y ropa con la vacuna.

INMUNIDAD: La vacuna produce inmunidad sólo 21 días después de la vacunación y su duración varía de acuerdo con la edad y susceptibilidades de las aves.

IMPORTANTE:

- Después de abierta, pierde dentro de poco tiempo, su capacidad de inmunizar, por lo tanto recomendamos administrarla inmediatamente.
- La vacuna, tan pronto llega donde el cliente, debe ser conservada a una temperatura entre -15°C y -25°C.
- Verificar la fecha de caducidad del producto que es de 1 (un) año después de la fecha de fabricación.
- Después de abierto el frasco la vacuna no se conserva.
- Quemar el frasco y todo el contenido que no haya sido utilizado.
- No vacunar las aves 21 días antes del sacrificio. Todas las aves susceptibles de un núcleo deben ser vacunadas al mismo tiempo. Si esto no es posible, las no vacunadas deben ser mantenidas en otro núcleo, con otro equipo de manejo.
- En casos de alto desafío de la enfermedad, se recomienda que la vacuna sea diluida en 500 ml de agua de bebida con las indicaciones anteriormente mencionadas y las aves sean vacunadas con jeringa dosificadora individualmente en el pico, con una dosis de 0,5 ml por ave.
- Entretanto, las recomendaciones de retiro de desinfectante y otros productos del agua de los bebederos antes y después de la vacunación también, se convierten en obligatorios.

PRESENTACIÓN:

El producto es presentado en cajas conteniendo 10 frascos con la suspensión de virus, sin diluyente, correspondiente a 10 ml (1 000 dosis) por frasco, junto con el prospecto. Mantener este o cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños.

REGISTRO: 4A-14473-AGROCALIDAD

ELABORADO POR: BIOVET-BRASIL

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035