VAXXON CORYZA GEL (BIO-KORIZA® HIDRÓXIDO DE ALUMINIO)

Vacuna contra la Coriza Infecciosa de las Aves
Solución inyectable

DESCRIPCIÓN: VAXXON CORYZA GEL (**BIO-KORIZA-HIDRÓXIDO DE ALUMINIO)**, es una vacuna inactivada contra la Coriza Infecciosa de las Aves, está constituida de una suspensión concentrada de *Haemophilus paragallinarum* del Tipo A (cepa 221), Tipo B (cepa 222) y Tipo C (cepa Modesto), cultivados en medio de cultivo sintético, inactivados y adicionados de Hidróxido de aluminio y otros adyuvantes.
Cada dosis de 0.5 ml contiene el mínimo de un billón de unidades formadoras de colonia de cada cepa.

INDICACIÓN: VAXXON CORYZA GEL (**BIO-KORIZA-HIDRÓXIDO DE ALUMINIO)** está indicada para la vacunación inicial y revacunación de las aves contra la Coriza Infecciosa de las Aves.

INMUNIZACIÓN: Para obtención de inmunidad sólida y duradera se debe:
- Emplear un programa de vacunación adecuado a las condiciones locales.
- Conocer las condiciones ambientales y de manejo.
- Conocer el estado inmunitario y de salud de la granja.
- Escoger la vacuna adecuada a cada etapa del programa de vacunación.
- Administrar la vacuna a través de método eficiente y seguro.
- Registrar: vacuna utilizada (muestra, tipo o cepa), edad y número del lote vacunado y nombre de los vacunadores.

ESQUEMA BÁSICO DE VACUNACIÓN:
1ª dosis: entre la 5º y 7º semana de vida, con **VAXXON CORYZA GEL** (**BIO-KORIZA-HIDRÓXIDO DE ALUMINIO)**.
2ª dosis: entre la 11º y 15º semana de vida, con **VAXXON CORYZA GEL** (**BIO-KORIZA-HIDRÓXIDO DE ALUMINIO)**.
A criterio del Médico Veterinario responsable, a partir de la 1ª dosis podrán ser administrados volúmenes mayores, entre 0.75 ml y 1.0 ml, dependiendo del desafío local y del tipo de ave, así como alterado el esquema básico de vacunación.

MODO DE USO: Colocar a baño María (40 - 42°C) durante unos minutos antes de usar, agitar el frasco de **VAXXON CORYZA GEL** (**BIO-KORIZA-HIDRÓXIDO DE ALUMINIO)** antes y durante el uso.
Aplicar por vía intramuscular, en el músculo de la pechuga, con vacunadora graduada y aguja 19 x $^{5}/_{8}$.
Para mayor informacion consultar el folleto sobre técnicas de administración de vacunas avícolas del Laboratorio BIOVET.

IMPORTANTE:
- Vacunar solamente animales saludables. Mantener bajo control de condiciones que producen inmuno depresión: estrés, deficiencias nutricionales, micotoxicosis, parasitismos, coccidiosis y demás enfermedades.
- Todos los animales de un mismo galpón deben ser vacunados en un mismo período.
- Después de la vacunación es necesario algún tiempo para el desarrollo de la inmunidad adecuada. Evitar exponer las aves frente a desafíos en este período.
- En condiciones de campo algunas aves pueden escapar a la inmunización dependiendo de la edad. La vacunación no es válida para toda la vida. En estos casos, la revacunación de las aves en la granja es necesaria.
- El intervalo ideal entre las 1ª y 2ª dosis es de 6 a 8 semanas.
- No vacunar las aves 21 días antes del corte.
- Controlar la inmunidad de la parvada a través de pruebas serológicas periódicas.

CONSERVACIÓN Y PLAZO DE VALIDEZ: Este producto se debe conservar refrigerado entre 2º y 8ºC.
Cuidado para no congelar! Debe ser utilizado hasta 2 años después de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN:
Frascos x 500 ml conteniendo 1 000 dosis.

REGISTRO: 4A-8789-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: VAXXINOVA Propietario/Fabricante BIOVET LTDA.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035