

VAXXON INTERMULTI 6 (INTER-MULTI 6®)

va:inova
Biovét



Vacuna inactivada séxtuple
Aplicación intramuscular



Síndrome de Baja Postura EDS-76, Bronquitis Infecciosa de las Aves M-41 y Coriza Infecciosa de las Aves Serotipos A(221), B(222) y C (modesto).

- Los antígenos virales son producidos en huevos embrionados SPF Biovet. Los antígenos de *Haemophilus paragallinarum* son producidos en medios semisintéticos preservándose todas las características inmunogénicas de las muestras.
- El alto grado de pureza de las materias primas utilizadas garantizan moderada reacción local.
- Reduce el tiempo y costo de mano de obra en la aplicación.
- Posee elevado poder antigénico e induce inmunidad duradera.
- Posee equilibrio perfecto entre los componentes de su fórmula, asegurando la estabilidad de la emulsión.

DESCRIPCIÓN: Vacuna inactivada, emulsionada en oleo mineral y otros adyuvantes. Está constituida de la muestra La Sota de virus de Newcastle: Massachussets M.41 de la Bronquitis Infecciosa de las Aves, SQP-81 de adenovirus (EDS-76) del Síndrome de baja postura y de las muestras de *Haemophilus paragallinarum* serotipos A(221), B(222) y C (modesto).

INDICACIÓN: Se recomienda la vacunación antes del inicio de producción. De esta forma, los altos niveles de anticuerpos circulantes confieren mayor inmunidad a las aves. La interacción múltiple de diversos antígenos en recientes estudios comprobaron que una dosis vacunal de 0.5 ml, gracias al adyuvante oleoso contenido, mantiene durante un largo período altos niveles de anticuerpos.

INMUNIZACIÓN: Para obtención de inmunidad sólida y duradera se debe:

- Emplear un programa de primo-vacunación adecuado a las condiciones locales.
- Conocer las condiciones ambientales y de manejo.
- Conocer el estado de salud e inmunitario de la granja.
- Escoger la vacuna adecuada a cada etapa del programa de vacunación.
- Administrar la vacuna por método eficiente y seguro.
- Registrar: vacuna empleada (muestra, tipo o cepa), edad y número del lote vacunado y nombre de los vacunadores.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN: La vacunación deberá ser hecha en aves entre 14 y 16 semanas de edad, previamente inmunizadas con vacunas vivas contra la enfermedad de Newcastle (NEW VACIN HB1 y/o LA SOTA), Bronquitis Infecciosa de las Aves (BIO BRONK VET H-120 y/o H 52) y vacuna contra la Coriza Infecciosa de las Aves (BIO KORIZA VET GEL), a fin de obtenerse una protección más sólida, uniforme y duradera.

A criterio del Médico Veterinario responsable, el esquema básico de vacunación podrá ser alterado.

MODO DE USO: Agitar el frasco de VAXXON INTERMULTI 6 (INTER-MULTI 6) antes y durante el uso. Aplicar por vía intramuscular, en el músculo de la pechuga, con vacunadora graduada y aguja 19 x 5/8.

IMPORTANTE:

- Momentos antes de la utilización de la vacuna, se recomienda que la misma sea retirada de la nevera y estabilizada a la temperatura entre 21° y 27°C, a fin de disminuir la viscosidad

natural de los oleos minerales helados y así facilitar la aplicación y evitar intensa reacción local.

- Vacunar solamente aves saludables. Mantenga bajo control las condiciones que producen inmunodepresión: estrés, deficiencias nutricionales, micotoxicosis, parasitismos, coccidiosis y demás enfermedades.
- Todas las aves de un mismo galpón deben ser vacunadas en un mismo período.
- Después de la vacunación es necesario algún tiempo para el desarrollo de la inmunidad adecuada. Evitar exponer las aves frente a desafíos en este período.
- No vacunar las aves 60 días antes del sacrificio.
- Controlar la inmunidad de la granja a través de pruebas serológicas periódicas.

CONSERVACIÓN Y PLAZO DE VALIDEZ: Este producto debe ser conservado refrigerado entre 2° y 8°C.

TENER CUIDADO PARA NO CONGELAR! Debe ser utilizado hasta 2 (dos) años después de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN:

Frascos x 500 ml conteniendo 1 000 dosis.

REGISTRO: 4A-18291-AGROCALIDAD.

ELABORADO POR: VAXXINOVA Propietario/Fabricante BIOVET LTDA.

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035