

VETAPROST®



Prostaglandina sintética Solución inyectable



Es un análogo de la prostaglandina F2 alfa que causa rápida regresión del cuerpo lúteo, ideal en la sincronización del celo, partos y auxiliar en problemas reproductivos de vacas, cerdas y yeguas.

COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

D-Cloprostenol sódico 0.075 mg
Vehículo cbp 1 ml

VETAPROST es una prostaglandina sintética a base de D-Cloprostenol, con afinidad a los receptores de la reproducción como la PGF2 alfa endógena producida fisiológicamente.

Tiene una acción 100% luteolítica, tiene la capacidad de inducir el parto, controla y previene desórdenes reproductivos.

VETAPROST reduce los días abiertos en vacas lecheras que presentan celos detectables (silenciosos) y sincroniza el celo.

MECANISMO DE ACCIÓN: El D-Cloprostenol actúa como agente luteolítico causando la regresión funcional y morfológica del cuerpo lúteo seguido por la manifestación del celo o parto.

INDICACIONES: VETAPROST está indicado para la inducción y sincronización del estro (celo), inducción y sincronización del parto en cerdas, expulsión de fetos momificados y abortos; auxiliar en el tratamiento de quistes luteínicos, retención de placenta, piometra y endometritis en vacas, cerdas y yeguas.

En cerdas, para sincronizar el parto no se debe aplicar antes del día 111 de gestación.

Generalmente se aplica al día 113 y el parto sucede entre las 20 y 36 horas posteriores.

INTERACCIÓN MEDICAMENTOSA: VETAPROST puede potencializar su actividad con el uso de oxitocina, ya que incrementa la actividad de la musculatura lisa del útero en el momento del parto. Los Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) bloquean la actividad farmacológica de las prostaglandinas.

EFFECTOS SECUNDARIOS: Pueden mostrar síntomas de intranquilidad, ligera diarrea o salivación. La sobredosis en pequeñas especies puede provocar shock y la muerte.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vacas: 2 ml vía intramuscular profunda.

Cerdas y yeguas: 1 ml vía intramuscular profunda.

CONTRAINDICACIONES: No administrar por vía intravenosa. No administrar a hembras gestantes a no ser que se desee provocar el aborto.

ADVERTENCIAS: Evite el contacto con la piel, ya que es absorbido a través de ella. En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón. En caso de deficiente nutrición y manejo inadecuado los resultados pudieran no darse al 100 %. Evite el manejo por mujeres embarazadas o personas con problemas asmáticos, ya que puede inducir el aborto y broncoconstricción. Usar guantes en el momento del manejo.

No se deja al alcance de los niños.

TIEMPO DE RETIRO: No use este producto 24 horas antes del sacrificio de los animales destinados para el consumo humano.

Leche: No requiere.

ALMACENAJE: Consérvese el producto entre 15 y 30 °C. Protéjase de la luz solar directa. Una vez utilizado incinere el frasco y sobrantes.

PRESENTACIONES:

Frasco x 4 ml (2 dosis).
Frasco x 20 ml (10 dosis).

REGISTRO: RIP FAR-20

ELABORADO POR: VETANCO S.A - ARGENTINA

DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR: TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.
Servicio al cliente: +593 32-855 035