

VETERCILÍN D



Combinación antibiótica antiinflamatoria de amplio espectro
Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada frasco con polvo contiene:

Penicilina G Procaínica3.000.000 UI
Penicilina G Sódica2.000.000 UI
Estreptomicina Sulfato equivalente en base 5 g

Diluyente:

Diclofenaco Sódico 15 mg/ml 20 ml

Después de reconstituido, cada frasco de **vetercilín D** contiene 28 ml de suspensión antibiótica. Cada ml de esta suspensión contiene 178.571 UI de penicilinas, 178.571 mg de estreptomicina y 0,5 gramos de diclofenaco.

INDICACIONES: Para el tratamiento de enfermedades causadas por gérmenes sensibles a la penicilina y la estreptomicina. Se recomienda especialmente en: carbón bacteridiano, carbón sintomático, septicemia, erisipela, tétanos, pododermatitis (panadizo), disentería vibriónica, poliartritis infecciosa, neumonía, pielonefritis, hepatitis necrótica infecciosa, difteria, conjuntivitis, peritonitis, otitis externa, adenitis equina, complicaciones de fiebre aftosa, muermo y tuberculosis.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO: Agregue la totalidad del diluyente (20 ml) al frasco con el antibiótico en polvo y administre 3 ml por cada 50 kilos de peso vivo del animal, diariamente por 3 a 5 días, de acuerdo con el criterio del Médico Veterinario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular profunda.

PRECAUCIONES:

Tiempo de retiro: Leche 3 días, carne 30 días.

PRESENTACIONES:

Frasco x 5 millones de UI penicilinas y 5 g de estreptomicina con su diluyente (300 mg de diclofenaco).

REGISTRO: 2C4-8403-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.