

## VETRIBAC D Solución®



### Tratamiento de coccidiosis Solución oral



#### COMPOSICIÓN:

Diclazuril ..... 1 g  
Excipientes c.s.p. .... 100 ml

**INDICACIONES:** Tratamiento de coccidiosis en pollos broilers, recria de ponedoras y reproductores, causada por *E. tenella*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. brunetti*, *E. maxima* y *E. acervulina*. El uso de diclazuril no reemplaza el uso de coccidiostatos de los programas normales de prevención, sino que está indicado en casos puntuales donde existe un cuadro clínico declarado o bien, existe un alto riesgo de presentarse la enfermedad clínica, por ejemplo cuando se produce el cambio de coccidiostatos del programa normal o cuando, por cualquier motivo, se ve afectada la inmunidad de los animales. En el caso de reproductoras que son inmunizadas contra eimerias mediante vacunación, usar diclazuril en caso de que se evidencien signos clínicos de la enfermedad post vacunación.

**DOSIFICACIÓN:** La dosis recomendada es 0.5 mg por kg de peso vivo, durante 48 horas en forma continuada. Dado un consumo medio de 200 ml de agua/kg de peso, recomendamos agregar 250 ml del producto por cada 1 000 litros de agua de bebida. Esta dosificación es estimativa y debe ajustarse de acuerdo a las variaciones productivas y estacionales del consumo de agua de cada granja. El profesional veterinario deberá ajustarla según el consumo diario medio del lote.

En caso de coccidiosis severa, la dosificación corresponde a 1 mg/kg de peso, equivalente a 500 ml de producto por cada 1 000 litros de agua de bebida.

**CONTRAINDICACIONES:** No tiene.

#### PERIODO DE RESGUARDO:

**Carne de broilers:** 0 días.

No administrar en aves de producción de huevos destinados al consumo humano.

#### PRESENTACIONES:

Envase plástico x 1 litro.

Frasco x 100 ml.

**REGISTRO:** 3A4-7709-AGROCALIDAD

**FABRICADO POR:** VETANCO S.A - ARGENTINA.

**DISTRIBUYE PARA EL ECUADOR:** TADEC CÍA. LTDA. Ambato - Quito - Guayaquil - Cuenca - Balsas - Sto. Domingo.  
Servicio al cliente: +593 32-855 035