

VIRKOS I



Garrapaticida - mosquicida
Baño de aspersión - Inmersión



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Cipermetrina 200 mg
 Vehículo c.s.

INDICACIONES: Control de los estados larvales, ninfales y adultos de las garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus* y *Amblyomma cajennense* y de las moscas que afectan al ganado bovino. Efectivo contra cucarachas, hormigas, mosquitos, arañas, jejenes y otros insectos que infestan establos, corrales e instalaciones.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:

Baño de Aspersión: Usando bombas de fumigar u otro equipo de aspersión, bañar al ganado con una mezcla de 1 ml de **virkos I** por litro de agua (1:1.000).

Para una bomba de 20 litros, utilizar 20 ml de **virkos I**. Esta cantidad es suficiente para bañar de 4-5 animales adultos.

Baño de Inmersión: Debe prepararse aplicando 1 litro de producto en 1.000 litros de agua (1:1.000). Se debe agitar intensamente el contenido del baño, o en su defecto puede hacerse pasar 80-100 animales para asegurar un buen mezclado. Estos animales deberán bañarse nuevamente al final.

Cuando el nivel del bañadero descienda un 10%, recargar usando 1.5 litros de **virkos I** por cada 1.000 litros de agua.

Instalaciones: Diluir 3 ml de producto en 1 litro de agua (1.000 ml) y fumigar pisos, paredes, vigas, etc.

PRECAUCIONES: Mantener fuera del alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser destruidos y no utilizarse para otros propósitos. No ingerir alimentos, ni fumar durante los tratamientos. En caso de ingestión accidental llamar al médico.

Tiempo de retiro: Leche 3 días, carne 3 días.

PRESENTACIONES:

Fascos x 20 ml.

Fascos x 60 ml.

Fascos x 1 litro.

REGISTRO: 3B1-3346-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: LABORATORIOS LIFE ECUADOR.