

VIRUELA AVIAR FARBIOVET



Vacuna para la prevención de la viruela aviar
Liofilizado + diluyente



FÓRMULA: Cada dosis contiene:

Virus de la viruela aviar cepa Cutter $\geq 1 \times 10^{4.0} \text{DIE}_{50}$ /DOSIS
Excipientes c.s.p. 1 dosis

ESPECIES: Aves.

DOSIS DE VIRUELA AVIAR FARBIOVET:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
POLLOS Y GALLINAS	10 ul = 0.01 ml	Intra alar
VACUNACIÓN: Primera vacunación desde los 7 días a las 10 semanas segunda vacunación desde las 10 semanas a las 20 semanas.		

INDICACIONES DE USO: Vacuna indicada para la prevención de la Viruela Aviar.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Intraalar.

DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD: La viruela aviar es una enfermedad de los pollos y los pavos causada por un Avipoxvirus. Se caracteriza por formar lesiones proliferativas y costras en la piel, y lesiones de tipo diftérico en la porción superior de los tractos digestivo y respiratorio.

En la forma cutánea la tasa de mortalidad es baja y las aves afectadas tienen una mayor probabilidad de recuperarse que las afectadas por la forma diftérica. En la forma diftérica, las lesiones proliferativas en los conductos nasales, y en la laringe y la tráquea, pueden causar dificultades respiratorias y la muerte por asfixia.

MECANISMO DE ACCIÓN: Estimula una replicación tenue del virus en el animal, pero no provoca una enfermedad clínica, brindado así inmunidad activa y protegiendo a las aves de una exposición natural.

PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS Y CONTRAINDICACIONES:

- Usar inmediatamente después de reconstituir el producto. No guardar sobrantes, los restos de la vacuna deben ser desechados.
- El uso de agujas, jeringas y tapones no estériles puede resultar en la formación de abscesos y decomisos de las aves.
- No utilizar en animales débiles, con sospechas de estar enfermos o convalecientes pues puede empeorar el cuadro.
- Una vez reconstituido, aplicar la vacuna inmediatamente después de su reconstitución, ya que los rayos solares deterioran el producto. No congelar.

INTERACCIONES: No reportado.

REACCIONES ADVERSAS: En casos extremadamente escasos, puede presentarse una reacción alérgica a la aplicación de la vacuna. No existe un antídoto específico, el tratamiento es netamente sintomático.

RETIRO: Ninguno.

PRESENTACIONES:

Frasco x 25 dosis
Frasco x 50 dosis
Frasco x 100 dosis

REGISTRO: 4A-12119-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha
Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag
Telf: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021
SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246
www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador