

VITAMINA K



Vitamina K
Solución



COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene:

VITAMINA K 1 g
Excipiente c.s.p. 100 ml

ACCIÓN TERAPÉUTICA: VITAMINA K inyectable, Vitaminas y minerales.

FORMA FARMACÉUTICA: Solución.

INDICACIONES DE USO: VITAMINA K es indispensable para la síntesis hepática de la protrombina, factor relacionado con la coagulación sanguínea. Un aporte deficitario de VITAMINA K causa una disminución del nivel de protrombina en la sangre por lo que puede originar estados hemorrágicos.

En bovinos, equinos, ovinos, porcinos, caninos y felinos, como coadyuvante en el tratamiento de: Hemorragias post-parto, post-quirúrgicas, traumáticas, etc.

También como antídoto para envenenamientos con warfarina, bromalodiona y otros anticoagulantes en los que se recomienda el uso de la VITAMINA K en las terapias con sulfamídicos e intoxicación por trébol dulce.

En avicultura: para el tratamiento de estados carenciales de VITAMINA K, para el tratamiento del síndrome hemorrágico, coccidiosis, prevención de hemorragias debido a tratamientos prolongados con sulfamidas y problemas de manejo como son los despiques.

DOSIS SUGERIDA: En caso de envenenamiento por rodenticidas antagonistas de la VITAMINA K como las cumarinas y bromalodiona.

Bovinos: 0.5 - 2.5 mg PA/kg IM o IV solo en caso de emergencia y diluida en solución salina. De manera práctica 0.5-2.5 ml VITAMINA K/10 kg.

Equinos: 0.5 - 2.5 mg PA/kg IM. De manera práctica 0.5 - 2.5 ml VITAMINA K/10 kg.

Ovinos – Porcinos: 0.5 - 2 mg PA/kg. De manera práctica 0.5 – 2.5 ml VITAMINA K/10 kg.

Caninos – Felinos: 2.5 mg PA/kg. De manera práctica 1.25 ml VITAMINA K/5 kg.

Aves: 1 litro VITAMINA K/1 000 litros de agua.

En caso de usarse para despiques debe administrarse 2 días antes y dos días después de este proceso.

Como coadyuvante en problemas causados por coccidias se recomienda usarlo durante 4-5 días.

La dosis podrá ser modificada a indicación expresa del Médico Veterinario.

FORMA DE ADMINISTRACIÓN: Intramuscular, subcutánea o intravenosa.

Oral. Para la aplicación en aves, primero realizar una pre-dilución de la dosis correspondiente, antes de adicionarlo al agua de bebida. Mediar solamente la cantidad de agua que se consuma en 1 día. No mezclar con antibióticos u otras sustancias.

USO VETERINARIO:

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Mantener el envase bien cerrado.
- Conservar en un lugar fresco y seco, entre 4°C y 32°C y 70% de HR.
- Proteger de la luz solar.

ADVERTENCIAS:

- No verter el producto en afluentes como ríos o arroyos.

- No reutilizar este envase.
- Al medicar por vía intravenosa es aconsejable hacerlo de manera lenta y diluida en solución salina. Usar pre-medicación antihistamínica.
- Venta bajo receta médica.

MANTENER EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN:

Frasco x 20 ml caja de 12 unidades

Q.F.R.: Nelly de Cobo

REGISTRO: 10A1-11809-AGROCALIDAD

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: C.C. Laboratorios Pharmavital Cia Ltda, km. 7 ½ vía Quito, Ambato – Ecuador

Servicio al cliente: (593) 2 2806167 - (593) 2 2806436