

XILA-20



Sedante – Analgésico
Solución Inyectable



COMPOSICIÓN: Cada ml contiene:

Xilacina 20 mg
Excipientes c.s.p. 1 ml

DOSIFICACIÓN DE XILA-20:

ESPECIE	DOSIS	VÍA DE ADMINISTRACIÓN
BOVINO	0,5 ml/100 kg	Intravenosa Intramuscular
EQUINO	5,5 ml/100 kg	Intravenosa
OVINO	0,12 ml/50 kg	Intravenosa
CAPRINO	0,25 ml/50 kg	Intramuscular
CANINOS FELINOS	0,55 ml/10 kg	Intravenosa Intramuscular
Aplicar según el Criterio del Médico Veterinario.		

INDICACIONES: La xilacina, un potente agonista alfa-adrenérgico, se clasifica como un sedante/analgésico con propiedades relajantes musculares. Aunque la xilacina posee varias de las acciones farmacológicas de la morfina, no causa excitación del SNC en felinos, equinos ni rumiantes, pero provoca sedación y depresión nerviosa central. En los caballos, la analgesia visceral es superior a la producida por la meperidina, el butorfanol o la pentozacina.

ADVERTENCIAS:

- Se debe evitar la estimulación sensorial mientras se produce el efecto del fármaco, ya que puede haber pérdida del efecto sedante o un período de conducta excitable y violenta. Los animales sedados deben vigilarse hasta que vuelvan a su estado normal.
- Evitar la administración intraarterial.
- Ocasionalmente puede aparecer timpanismo en bovino recostado, lo que se evitará manteniendo al animal en decúbito esternal. Para evitar la aspiración de saliva o alimento, descender la cabeza y el cuello del animal.
- No alimentar a los animales antes de usar el producto.
- Los animales de edad avanzada y debilitados son más sensibles a xilacina, mientras que los animales nerviosos o muy excitables pueden necesitar una dosis relativamente alta.
- Evitar la extravasación cuando se administre vía IV.
- En todas las especies aplicar con precaución en aquellos que presenten:
 - Marcada depresión respiratoria.
 - Alteraciones cardíacas (la xilacina induce arritmias y es un depresor directo del miocardio).
 - Hipotensión arterial o en caso de shock.
 - Insuficiencia renal (la xilacina se excreta por la orina).
 - Insuficiencia hepática (la xilacina se metaboliza en primera instancia en el hígado).
- Epilepsia.

ESPECIES: Equino, Bovino, Ovino, Caprino, Caninos y Felinos.

ALMACENAMIENTO:

- Almacenar a temperatura entre 15 °C - 30 °C y humedad de 75%.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

TIPO DE VENTA: Bajo receta restringida.

RETIRO: Bovinos de carne 3 días, leche de 48 horas.

USO DURANTE LA GESTACIÓN Y LACTANCIA: Hay poca información del uso de la xilacina durante la gestación.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Acepromacina: El uso combinado con xilacina suele ser seguro, pero se pueden presentar efectos hipotensores aditivos, usar con cautela en animales susceptibles a complicaciones hemodinámicas.

Otros agentes depresores del SNC (barbitúricos, narcóticos, anestésicos, fenotiacínicos): Efecto depresivo aditivo sobre el SNC, requieren un control y reajuste de dosis cuando se los usa junto con la xilacina.

Epinefrina: Junto con Xilacina puede causar arritmias ventriculares.

Reserpina: No se debe usar en caballos junto con la xilacina.

PRESENTACIONES:

Frasco x 20 ml

Frasco x 50 ml

REGISTRO: 8A3-15128-AGROCALIDAD

ELABORADO Y DISTRIBUIDO POR: FARBIOPHARMA S.A.

Dirección: Calle Guayas N° E3-296 y Av. Pichincha

Sector Lomas de la Concepción, vía a Pintag

Tel: (593) 2 2794046 – 2794031 FAX: 2794021

SERVICIO AL CLIENTE: 1800327246

www.farbiopharma.com/ Quito-Ecuador